

# ជម្លីវអេដស៍ - ចម្លើយដល់សំណួររបស់លោកអ្នក (HIV/AIDS - Your questions answered)

ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2003

Cambodian



## តើ HIV ជាអ្វីទៅ?

HIV គឺជាជំងឺឬពាក្យ Human Immunodeficiency Virus ។ HIV បណ្តាលឲ្យកើត AIDS (ជម្ងឺអេដស៍)។

## តើ AIDS ជាអ្វីទៅ?

AIDS គឺជាជំងឺឬពាក្យ Acquired Immune Deficiency Syndrome ។ Acquired មានន័យថា មិនមែនតម្រូវឡើយ។ Immune Deficiency មានន័យថា ការរលាយធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រព្រឹត្តិការពាររោគរបស់រាងកាយ។ Syndrome និយាយសំដៅទៅកាន់ជម្ងឺផ្សេងៗដែលអាចមានទំនាក់ទំនងនឹងជម្ងឺមួយទៀត។ នៅក្នុងករណីនេះ ជម្ងឺទាំងឡាយដែលមានប្រៀបលើប្រព័ន្ធការពាររោគដ៏ទន់ខ្សោយរបស់រាងកាយ ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃការចាប់ផ្តើមនៃ AIDS ។

## តើលោកអ្នកឆ្លង HIV តាមរបៀបណា?

HIV អាចឆ្លងតាមរយៈ:

- ការរួមភេទដែលគ្មានវិធីការពារ តាមទ្វារមាស ឬទ្វារក្រចក ជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ដែលមាន HIV ។
- ការប្រើប្រាស់ឆ្នាំងស្រៀងបរិក្ខារមូលចាក់ជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមាន HIV ។
- ពីម្តាយដែលមាន HIV ទៅកូន ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ សំរាលកូន ឬតាមរយៈការបំបៅដោះកូន។
- ការរួមភេទតាមមាត់ដែលគ្មានវិធីការពារជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមាន HIV (មិនសូវទូទៅទេ)។

នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី HIV ឆ្លងទូទៅបំផុតតាមរយៈការរួមភេទដោយគ្មានស្រោមការពារ និងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឆ្នាំងស្រៀងបរិក្ខារមូលចាក់។

**តើខ្ញុំអាចឆ្លង HIV ពីសត្វល្អិត សត្វ ទ្រព្យ ឬអង្គុយក្នុងបង្គន់ ឱប ចាប់លាក់ដៃ វត្ថុប្រើក្នុងផ្ទះ រាងហែលទឹកសាធារណៈជាដើម ឬទេ?**

មិនអាចឆ្លងទេ! HIV មិនអាចឆ្លងរាលដាលតាមរយៈការប៉ះពាល់សាមញ្ញក្នុងសង្គម ឬគ្រួសារទេ។ HIV រស់មិនបានយូរ នៅខាងក្រៅរាងកាយឡើយ។ សាប៊ូធ្វើឲ្យស្ទើរដែលប្រើជាធម្មតានៅក្នុងផ្ទះ ឬ សាប៊ូ និងទឹកក្តៅខណ្ឌអាចសម្លាប់វាបាន។

## តើការរួមភេទដោយសុវត្ថិភាព ជាអ្វីទៅ?

ការរួមភេទដោយសុវត្ថិភាព គឺជាការរួមភេទដែលគ្មានការផ្លាស់ប្តូររាងដៃដៃគូរួមភេទ នូវទឹកកាម ទឹករំលិលនៃយោនី ឬ ឈាម។ ការប្រើស្រោមអនាម័យដោយត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងពេលរួមភេទ (ទន្ធកូប ឬ ទ្វារមាស) និងកាត់បន្ថយជាខ្លាំងនូវលទ្ធភាព គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការចម្លង HIV ។ ត្រូវប្រើស្រោមអនាម័យជាមួយនឹងប្រេងរំលិលផលិតពីជាតិទឹក។ ស្រោមអនាម័យសំរាប់ស្រ្តីក៏មានផងដែរ ហើយគួរប្រើជាមួយនឹងប្រេងរំលិលផលិតពីជាតិទឹក។ សកម្មភាពរួមភេទដោយសុវត្ថិភាព មានរួមទាំង ការសេពកាមដោយដៃទៅវិញទៅមក ស្ទាប ឱប ការប៉ះកិតរាងកាយ ការធ្វើសរសៃឲ្យស្រួលស្រាល។ គួរប្រើការរួមភេទដោយសុវត្ថិភាព បើដៃគូមួយមាន HIV ឬបើដៃគូមួយទៀតមិនដឹងប្រាកដថា តើដៃគូនោះមាន HIV ដែរឬទេ។ ការរួមភេទដោយសុវត្ថិភាព (ស្រោមអនាម័យ) ក៏ដឹងបង្ការមិនឲ្យចម្លងជម្ងឺកាមរោគ (STIs) ទូទៅផងដែរ ឧទាហរណ៍: chlamydia និង ប្រមេះទឹកបាយ។

## តើខ្ញុំអាចឆ្លង HIV ពីការរួមភេទតាមមាត់ឬទេ?

ការរួមភេទតាមមាត់ដែលគ្មានវិធីការពារ មានលទ្ធភាពគ្រោះថ្នាក់ទាបក្នុងការចម្លង HIV ប៉ុន្តែលោកអ្នកគួរប្រើស្រោមអនាម័យ ឬចៀសវាងការចេញទឹកកាមទៅក្នុងមាត់ នៅពេល:

- ដៃគូណាមួយមានដំបៅពេលនៅនឹងមាត់ ឬ អញ្ចាញធ្មេញចេញឈាម; ឬ
- ទើបនឹងដុះធ្មេញ ឬ ប្រើខ្សែសម្ពាត់ចន្លោះធ្មេញ។

## តើការថើបជញ្ជក់មាត់យ៉ាងជ្រៅ គឺជាវិធីចម្លង HIV ឬទេ?

នេះជាវិធីយាបថមួយដែលមានលទ្ធភាពគ្រោះ

ថ្នាក់ទាបបំផុត។ ទឹកមាត់នៃអ្នកមាន HIV មានបរិមាណ HIV តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីឆ្លង HIV ទឹកមាត់ជាច្រើននឹងត្រូវចូលទៅក្នុងឈាមលោកអ្នក តាមរយៈដំបៅពេលនៅនឹងមាត់ ឬ អញ្ចាញធ្មេញដែលចេញឈាម។

## តើការបញ្ចូលឈាមផ្តល់លទ្ធភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លង HIV ឬទេ?

ចាប់ពីខែឧសភា ឆ្នាំ 1985 មក អំណោយឈាមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី បានត្រូវធ្វើតេស្តរកមេរោគ HIV ។ នេះមានន័យថា ឥឡូវនេះ ការបញ្ចូលឈាមផ្តល់លទ្ធភាពគ្រោះថ្នាក់ទាបបំផុតក្នុងការចម្លង HIV ។

## តើខ្ញុំអាចឆ្លង HIV តាមរយៈការផ្តល់អំណោយឈាមឬទេ?

មិនអាចឆ្លងទេ - មូល កញ្ចប់ សម្លីជូត និងកូនកាំបិតចាក់ម្រាមដៃ មិនត្រូវបានប្រើសាជាថ្មីសោះឡើយ។

## តើអ្វីទៅដែលជាពោតសញ្ញានៃ HIV ?

ពោតសញ្ញានៃ HIV មានភាពទូទៅដូចគ្នាដឹងជម្ងឺមួយចំនួន។ បើលោកអ្នកគិតថា លោកអ្នកប្រហែលជាមាន HIV ឬបើលោកអ្នកមានសញ្ញាណាមួយនៅខាងក្រោមនេះ (ឬសញ្ញាគួបផ្សំគ្នា) អស់ពេលមួយខែ ឬ យូរជាងនេះ លោកអ្នកគួរពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នក។

ពោតសញ្ញាទូទៅនៃជម្ងឺទាក់ទងនឹង HIV គឺ:

- ពោតសញ្ញាប្រៀបដូចជាគ្រុនផ្តាសាយ។
- ឆ្អើយហត់ខ្លាំង និង ជាប់រហូត។
- គ្រុនក្តៅ គ្រុនរងា និង បែកញើសនៅពេលយប់។
- ស្រកទម្ងន់យ៉ាងលឿន។
- ឡើងកូនកណ្តុរនៅនឹងក កន្លែងភ្លៀក ឬក្រលៀន។
- គ្រាប់ចំណុចពណ៌សឬស្នាមមិនធម្មតានៅក្នុងមាត់។

- ស្នាមប្រដាប់បង្កើននៃស្បែក (ឡើងប៉ោង ឬ រាបស្មើ ជាធម្មតាមិនឈឺចាប់ និង មានពណ៌រាងស្មើ)។
- ក្អកជាប់ ឬក្អកស្អិត។
- រាករូស។
- ចុះថយនូវការឃ្លានអាហារ។

ជនម្នាក់ដែលមាន HIV ប្រហែលជាគ្មានរោគសញ្ញាណាមួយទេ ប៉ុន្តែជននេះអាចមានវិរុសហើយអាចចម្លងវាតាមរយៈឈាម ឬ អង្គធាតុទឹកនៃរាងកាយ។

**តើខ្ញុំអាចធ្វើតេស្តរកមើលថាមាន HIV ដែរឬទេ?**

អាចធ្វើបាន។ តេស្តឈាមអាចតាមរកមើលដឹង HIV ។ បើលោកអ្នកគិតថា លោកអ្នកមានប៉ះពាល់នឹងមេរោគ HIV ចូរទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិត លោកអ្នក ឬ អញ្ជើញទៅកាន់កន្លែងមួយក្នុងចំណោមសេវានៅក្នុងបញ្ជីរាយឈ្មោះ។

បើគេរកឃើញ HIV នៅក្នុងឈាមរបស់ជនមួយរូប គេនិយាយថា ជននេះវិជ្ជមានទៅនឹង HIV ។

គេមិនអាចតាមរកឃើញវិរុសនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ក្រោយពីជនមួយរូបឆ្លង HIV ឡើយ។ ហេតុការណ៍នេះអាចត្រូវធ្វើតេស្តមួយ នៅក្រោយខែក្រោយមកទៀត។ អ្នកទាំងអស់ដែលសុំធ្វើតេស្ត HIV ត្រូវទទួលការពិគ្រោះឱវាទនៅមុនពេល និង ក្រោយពេលធ្វើតេស្ត។

**តើតេស្ត HIV ជាប់ទាក់ទងនឹងអ្វីខ្លះទៅ?**

- ការធ្វើតេស្តគួរតែជាការស្ម័គ្រចិត្ត ហើយធ្វើឡើងដោយមានការអនុញ្ញាតដែលជ្រាបដឹងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។
- គួរផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលជាប់ទាក់ទងនៅក្នុងការធ្វើតេស្តនេះ។
- គួរធ្វើការពិភាក្សាថា តើតេស្តនេះមានន័យអ្វីទៅ។
- ការពិគ្រោះយោបល់នៅក្រោយពីធ្វើតេស្ត។

ការពិគ្រោះយោបល់ក្រោយធ្វើតេស្ត មានសារសំខាន់ណាស់ ដោយមិនគិតអំពីលទ្ធផលអ្វីឡើយ។ បើតេស្តនេះផ្តល់ លទ្ធផលវិជ្ជមាន ការពិគ្រោះយោបល់ក្រោយធ្វើតេស្តអាចផ្តល់ជំនួយផ្លូវចិត្ត ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំងឺនេះ និងការបញ្ជូនទៅកាន់សេវាជំនួយទាំងពួង។ បើតេស្តនេះផ្តល់លទ្ធផលអវិជ្ជមាន ការពិគ្រោះយោបល់ក្រោយធ្វើតេស្តអាចពង្រឹងនូវព័ត៌មានអំពីការបង្ការកុំឲ្យមាន HIV ។

**តើ AIDS ខុសពី HIV យ៉ាងណាដែរ?**

**HIV បណ្តាលឲ្យមាន AIDS ។**

នរណាមួយដែលមាន HIV ប្រហែលជាគ្មាន AIDS ឡើយ។ HIV ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររោគនៃរាងកាយមានភាពទន់ខ្សោយ ដោយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនេះទទួលយកជំងឺនិងមហារីកផ្សេងៗ។ ចំពោះមនុស្សភាគច្រើនដែលមាន HIV ការរីកចម្រើនទៅជា AIDS មានសភាពយឺតយូរគួរសមដែរ ដោយត្រូវការពេលជាច្រើនឆ្នាំចាប់ពីពេលមាន HIV រហូតដល់លូតលាស់ក្លាយទៅជា AIDS ។ ដោយគ្មានការព្យាបាល អ្នកដែលមាន HIV ជាទីបញ្ចប់នឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយអាចកើត AIDS ក្នុងរង្វង់ពេល 5-10 ឆ្នាំ។ ទោះដូច្នេះក្តី ក៏ជនមួយចំនួនតូចប្រហែលជាមិនបង្ហាញនូវសុខភាពទ្រុឌទ្រោមឡើយសូម្បីតែនៅក្រោយពេល 10 ឆ្នាំក៏ដោយ។ រោគវិនិច្ឆ័យនៃ AIDS អាចត្រូវធ្វើតេស្តពិសេសមួយចំនួននៅមន្ទីរពិសោធន៍។

**តើគេអាចព្យាបាលឲ្យសះស្បើយ ឬ ព្យាបាល HIV/AIDS ឬទេ?**

នៅគ្រាសព្វថ្ងៃនេះ គេគ្មានថ្នាំបង្ការ ឬ ថ្នាំព្យាបាល HIV ឬ AIDS ឲ្យសះស្បើយឡើយ។ យ៉ាងណាមិញ គេមានការព្យាបាលប្រើថ្នាំដែលអាចពន្យារនឹងមានលទ្ធភាពបង្ការកុំឲ្យមានជំងឺទាក់ទងនឹង HIV ហើយបន្ថយពេលឈានទៅកាន់ដំណាក់កាលនៃការកើត AIDS ។ ថ្នាំទាំងនេះមិនងាយស្រួលប្រើទេ ដោយសារតែផលវិបាកនៃថ្នាំ និង ភាពលំបាកនៃការព្យាបាល។ នៅពេលដែលនរណាមួយចាប់ផ្តើមការព្យាបាលប្រើថ្នាំសំរាប់ HIV ហើយ អ្នកនោះគួរបន្តប្រើអស់ពេលមួយជីវិត។ គេក៏មានការព្យាបាលជំងឺជាក់លាក់ច្រើនដែរ ដែលទាក់ទងនឹង HIV និង AIDS ។

ការព្យាបាលបង្កប់បន្ថែម ក៏ត្រូវបានប្រើផងដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងផលវិបាកនៃការព្យាបាលដោយថ្នាំ និងកែលម្អសុខុមាលភាព។ ថ្នាំនិងការព្យាបាលថ្មីទាំងពួង កំពុងតែទទួលការសាកល្បងនៅគ្រប់ពេលទាំងអស់។

**ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមឬទេ?**

Melbourne Sexual Health Centre, Carlton  
ទូរស័ព្ទ: 03 9347 0244  
TTY សំរាប់អ្នកទូរស័ព្ទដែលថ្លង់: 03 9347 8619  
តំបន់ជនបទ: 1800 032 017  
សេវាឥតមានគិតថ្លៃ ហើយលាក់ការសម្ងាត់។

**សេវាទូទាំងរដ្ឋ:**

AIDSLINE - 9347 6099  
តំបន់ជនបទ: 1800 133 392  
TTY: 1800 032 665  
  
Access Information Centre at The Alfred 9276 6993  
  
www.accessinfo.org.au  
  
Victoria AIDS Council / Gay Men's Health Centre 9865 6700  
ទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃ: 1800 134 840  
TTY: 9827 3733  
www.vicaids.asn.au  
  
The Centre Clinics:  
Northcote Community Health Centre 9481 7155  
St Kilda 9525 5866  
  
Family Planning Victoria 9257 0100  
Action Centre 9654 4766

**គ្លីនិកព្យាបាលជំងឺកាមរោគ នៅតំបន់ជនបទ:**

The Annexe Sexual Health Clinic, Ballarat 03 5333 1635  
  
STD Clinic - Community Health Bendigo 03 5434 4330  
  
Geelong Sexual Health Clinic 03 5221 4735  
  
STD Clinic - Vermont Street Clinic, Wodonga 03 6051 7470  
  
STD Clinic - Latrobe Regional Hospital, Traralgon 03 5173 8000