

การทำแท้ง

การทำแท้ง (หรือ "การยุติการตั้งครรภ์") คือการยุติการตั้งครรภ์โดยเจตนา

- การทำแท้งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายในรัฐวิคตอเรีย
- การทำแท้งมีอยู่สองประเภท: การผ่าตัดและการกินยา ทั้งสองประเภทปลอดภัยและเชื่อถือได้
- ในรัฐวิคตอเรีย คุณสามารถทำแท้งด้วยการกินยาเมื่อตั้งครรภ์ได้แก่สัปดาห์ ("การตั้งครรภ์")
คุณสามารถทำแท้งด้วยการผ่าตัดเมื่ออายุครรภ์ประมาณหกสัปดาห์เป็นต้นไป
- คลินิกทำแท้งในรัฐวิคตอเรียล้อมรอบด้วยอาณาบริเวณที่กว้างขวางถึง 150 เมตรที่คุณสามารถเข้าออกโดยปลอดภัย
นี่หมายความว่า คุณสามารถเข้าและออกจากคลินิกโดยไม่มีใครรบกวนคุณได้
- แพทย์ผู้ซึ่งไม่ต้องการทำแท้งจะต้องส่งตัวคุณไปยังแพทย์ที่ไม่รังเกียจที่จะให้ข้อมูลและบริการทำแท้งแก่คุณ
- อาการแทรกซ้อนรุนแรงจากการทำแท้งไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณหลังจากการทำแท้ง
โปรดหาความช่วยเหลือทางการแพทย์
- หากคุณกำลังคิดจะทำแท้ง และต้องการได้รับข้อมูลและบริการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรัฐวิคตอเรีย โปรดค้นหาที่:
1800myoptions.org.au หรือโทรไปที่ 1800MyOptions ที่หมายเลข 1800 696 784

การเปรียบเทียบการทำแท้งโดยการกินยากับการทำแท้งโดยการผ่าตัด

	การทำแท้งโดยการกินยา	การทำแท้งโดยการผ่าตัด
ใช้กรรมวิธีแบบไหน?	<ul style="list-style-type: none">• ไม่ใช่การผ่าตัด• คล้ายกับการแท้งบุตรธรรมดา• กินยาเม็ดสำหรับกรรมวิธีนี้	<ul style="list-style-type: none">• กรรมวิธีผ่าตัด• ปกติจะใช้การวางยาสลบบางประเภท
ได้ผลแค่ไหน?	<ul style="list-style-type: none">• ได้ผลร้อยละ 95 ถึง 98• ปริมาณร้อยละห้าของสตรีต้องกินยาเม็ดเพิ่ม หรือการผ่าตัดเล็กๆ เพื่อให้การทำแท้งสมบูรณ์	<ul style="list-style-type: none">• ร้อยละ 98 ประสบความสำเร็จ
บริการสุขภาพไหนที่ให้บริการนี้?	ตรวจดู 1800 MyOptions.org.au ทางเลือกรวมถึง: <ul style="list-style-type: none">• แพทย์จีพี (แพทย์ทั่วไป)• บริการสุขภาพชุมชน• โรงพยาบาลและคลินิกทำแท้งเอกชน• โรงพยาบาลสาธารณะ• ผ่านทาง 'telehealth' ซึ่งให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การทดสอบเพื่อยืนยันการตั้งครรภ์กระทำในห้องที่ที่คุณพำนักอยู่	ตรวจดู 1800MyOptions.org.au ทางเลือกอาจรวมถึง: <ul style="list-style-type: none">• โรงพยาบาลสาธารณะ• โรงพยาบาลเอกชน• คลินิกเอกชนที่เปิดทำการเวลากลางวัน
จะทำแท้งได้ที่ไหน?	การให้คำปรึกษาด้านการแพทย์กระทำที่คลินิก หรือผ่านทาง telehealth (ทางโทรศัพท์) ส่วนการทำแท้งกระทำที่บ้านหรือในสถานที่ที่คล้ายๆ กัน	ในโรงพยาบาลหรือในแผนกผ่าตัดกลางวัน

	การทำแท้งโดยการกินยา	การทำแท้งโดยการผ่าตัด
ใช้เวลานานเท่าไร?	หลังจากกินยาเม็ดแรกแล้ว ใช้เวลารอ 24 ถึง 48 ชั่วโมงก่อนที่จะกินยาเม็ดที่สอง โดยเฉลี่ย หลังจากนั้นประมาณสี่ถึงหกชั่วโมง การแท้งจะเกิดขึ้น	การผ่าตัดใช้เวลา 15 นาที ไม่รวมเวลาของการเตรียมตัวและการพักผ่อนอีกสองสามชั่วโมง
การตั้งครรภ์ควรอยู่ในระยะใดเมื่อทำแท้ง?	การตั้งครรภ์ที่สามารถมองเห็นได้จากการทำอัลตราซาวนด์ และอายุครรภ์ถึงหกสัปดาห์	ระยะที่ปลอดภัยที่สุดและนิยมทำกันมากที่สุดคือเมื่ออายุครรภ์อยู่ระหว่าง 6 ถึง 12 สัปดาห์
มีเลือดออกไหม?	โดยทั่วไป เลือดจะออกนานระหว่าง 10 ถึง 16 วัน	อาการเลือดออกแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล และอาจเบาหรือหนักก็ได้ อาการเลือดออกนี้อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์ แต่อาจะไม่ได้และอาจไม่สม่ำเสมอ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร?	โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอทราบค่าใช้จ่าย	โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอทราบค่าใช้จ่าย
จะเริ่มการคุมกำเนิดได้เมื่อไร?	การคุมกำเนิดแบบต่างๆ ส่วนใหญ่เริ่มได้ทันทีหรือหลังจากที่กินยาเพื่อการทำแท้งแล้วในไม่ช้า	การคุมกำเนิดวิธีต่างๆ ส่วนใหญ่เริ่มได้ในวันเดียวกับที่ทำแท้งโดยการผ่าตัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

แผ่นข้อเท็จจริงนี้เป็นหนึ่งในสามแผ่นเกี่ยวกับการทำแท้งในรายการคำแปลเรื่องสุขภาพ โปรดอ่านเอกสารต่อไปนี้ด้วย:

- กรรมวิธีการทำแท้ง – การกินยา
- กรรมวิธีการทำแท้ง – การผ่าตัด

จะขอความช่วยเหลือได้จากที่ใด

- [1800 my options](https://www.1800myoptions.org/) โทร [1800 696 784](https://www.1800696784.com/) ลาม 131450
- แพทย์จีพีของคุณ
- [Family Planning Victoria](https://www.familyplanning.vic.gov.au/) Tel. (03) 9257 0100 หรือโทรฟรี 1800 013 952
- บริการสุขภาพชุมชน: <https://www2.health.vic.gov.au/primary-and-community-health/community-health/community-health-directory>
- [Pregnancy, Birth and Baby Helpline](https://www.pregnancybirthandbaby.org.au/) 1800 882 436

อนุมัติและจัดพิมพ์โดยรัฐบาลรัฐวิคตอเรีย 1 Treasury Place, Melbourne.

© รัฐวิคตอเรีย กระทรวงบริการสุขภาพและมนุษย์ มกราคม 2019

หาดูได้ที่ <<http://healthtranslations.vic.gov.au/>>