

Bản thỏa thuận của bệnh nhân: liều buprenorphine/naloxone phát đem đi

Tên bệnh nhân:

Ngày sinh:

 / /

Buprenorphine là loại thuốc có công hiệu khi sử dụng một cách an toàn và có trách nhiệm. Tuy nhiên, khi sử dụng sai, buprenorphine có thể gây hại nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong. Tiêm chích buprenorphine và sử dụng cùng với các benzodiazepine đã liên quan đến một số trường hợp tử vong vì thuốc gây nghiện tại Victoria. Tiêm chích buprenorphine đã nằm trong miệng của người khác đã khiến một số trường hợp bị nhiễm nấm ở mắt khiến thị lực bị giảm sút hoặc mù lòa tại tiểu bang Victoria. Tiêm chích thuốc pha chế để uống có thể làm cho tĩnh mạch bị hư hại.

Bản thỏa thuận này nói về vấn đề an toàn đối với liều thuốc phát đem đi, đây là **BẠN tự chịu trách nhiệm về liều thuốc phát đem đi mà bác sĩ đã kê toa cho **BẠN**, để giữ an toàn cho bản thân mình và người khác.**

1. Tôi hiểu rằng liều buprenorphine của tôi đã được kê toa chỉ cho riêng tôi mà thôi, dựa trên mức độ dung nạp opioid của tôi. Nếu người khác uống liều thuốc của tôi, họ có thể bị quá liều hoặc thậm chí tử vong.
2. Tôi biết rằng liều thuốc phát đem đi không phải là quyền hạn đương nhiên.
3. Tôi hiểu rằng liều thuốc phát đem đi chỉ được phát cho tôi nếu người kê toa thuốc cho tôi đã đánh giá rằng tôi ổn định và có nhu cầu chính đáng (như không thể đến nhà thuốc vì bận đi làm hoặc đi học, cần đi xa gấp hoặc nhà thuốc đóng cửa).
4. Tôi hiểu rằng số lượng liều thuốc phát đem đi tôi nhận được có thể bị người kê toa thuốc cho tôi giảm bớt hoặc cắt hẳn (sau khi hội ý với dược sĩ của tôi và tôi) khi có mối lo ngại xác đáng về khả năng tôi quản lý liều thuốc phát đem đi của tôi một cách an toàn hoặc có trách nhiệm.
5. Tôi hiểu rằng điều quan trọng là không chia sẻ liều thuốc phát đem đi của tôi với bất kỳ ai khác vì nguy cơ bị quá liều.
6. Tôi hiểu rằng điều quan trọng là cất giữ liều thuốc phát đem đi của tôi một cách an toàn. Cất giữ liều thuốc phát đem đi một cách an toàn bao gồm:
 - không để liều thuốc phát đem đi mà không có người trông coi trong xe hơi, trên phương tiện giao thông công cộng, máy bay, các khu vực công cộng, v.v.
 - không để liều thuốc phát đem đi ở nơi mà người khác có thể nhìn thấy hoặc lấy được (ví dụ như không cất trong tủ lạnh, trong bao đựng, trên kệ hoặc trên bàn)
 - bảo đảm cất và khóa kỹ liều thuốc phát đem đi (ví dụ như trong tủ, ngăn kéo, hộp đựng tiền hoặc tủ sắt)
 - luôn luôn cất liều thuốc phát đem đi ngoài tầm tay trẻ em
7. Tôi đồng ý hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả liều thuốc phát đem đi tôi nhận được và tôi hiểu rằng các liều thuốc phát đem đi bị mất hoặc bị đánh cắp, hoặc liều thuốc phát đem đi sử dụng trước có thể sẽ không được thay thế.
8. Nếu được kê toa cho thuốc naloxone, tôi hiểu rằng tôi sẽ cần học cách sử dụng thuốc này để hóa giải tình trạng bị quá liều opioid có thể xảy ra.
9. Tôi hiểu rằng người kê toa thuốc cho tôi có thể giảm hoặc ngừng kê toa liều thuốc phát đem đi nếu tôi không tuân theo bất kỳ phần nào của thỏa thuận này.

Chữ ký bệnh nhân:

Ngày: / /

Người kê toa thuốc:

Ngày: / /

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về việc điều trị, nếu đang gặp vấn đề, nếu cần có người tư vấn độc lập hoặc trợ giúp, hoặc cảm thấy mình bị cơ sở cung cấp dịch vụ dược liệu pháp đối xử bất công – bạn có thể liên lạc với dịch vụ Pharmacotherapy Advocacy, Mediation and Support (PAMS) qua số 1800 443 844 (làm việc từ 10 giờ sáng-6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu).