

مرض المكورات الرئوية (pneumococcal) في مرحلة الطفولة

Arabic

- الأطفال حتى سن خمس سنوات من العمر مع عوامل الخطر الطبية التي تضعهم في خطر أعلى للإصابة بالمكورات الرئوية. هؤلاء الأطفال بحاجة إلى جرعات إضافية من لقاح المكورات الرئوية عند بلوغ 6 أشهر وأربع إلى خمس سنوات من العمر.

يرجى التحدث إلى طبيبك لمناقشة الحالات الطبية الكامنة مثل:

- عدوى فيروس نقص المناعة البشرية
- الأورام الخبيثة في الدم
- التليف الكيسي
- تسرب السائل النخاعي
- تحويلة داخل الجمجمة
- زراعات القوقعة
- نقص المناعة بسبب الأمراض أو الأدوية أو العلاج
- اختلال وظائف الطحال أو لا يوجد طحال
- متلازمة داون
- جميع الأطفال الذين يولدون أقل من 28 أسبوعاً من الحمل
- الأمراض المزمنة للقلب والرئة والكلى والسكري.

الآثار الجانبية المحتملة للقاح المكورات الرئوية

الآثار الجانبية الشائعة

- ألم وإحمرار وتورم في موضع الحقن
- درجة حرارة منخفضة

الآثار الجانبية النادرة للغاية

- رد فعل حساسية شديد.

إذا حدث رد فعل خفيف، يمكن تخفيض الآثار الجانبية بواسطة:

- وضع قطعة قماش مبللة باردة على موضع الحقن المؤلم
- عدم وضع ملابس زيادة على طفلكم
- قد تكون هناك حاجة للباراسيتامول لتخفيف الألم و/أو ارتفاع درجة الحرارة (تحققوا من المصق للإستخدام الصحيح)
- إعطاء طفلكم سوائل إضافية للشرب.

إذا كانت ردود الفعل شديدة أو مستمرة، أو إذا كنتم قلقين على طفلكم، اتصلوا بطبيبكم أو المستشفى.

قائمة المتطلبات ما قبل التطعيم

قبل أن يتم تطعيم طفلكم، أخبروا الطبيب أو الممرضة إذا كان طفلكم:

يوفر جدول برنامج التطعيم الوطني لقاح مجاني ضد المكورات الرئوية لجميع الرضع في الشهر الثاني والشهر الرابع والشهر الثاني عشر من العمر. الأطفال الذين هم أقل من خمس سنوات من العمر والذين يعانون من حالات صحية كامنة هم أيضا مؤهلين للحصول على جرعة إضافية من لقاح المكورات الرئوية.

مرض المكورات الرئوية

يسبب مرض المكورات الرئوية لدى الأطفال الصغار مرض خطير مثل إلتهاب الدم وحتى الموت. الطفل الذي يعاني من حالة طبية خطيرة هو في خطر أكبر من الإصابة بالإلتهابات التي تهدد الحياة والدخول إلى المستشفى.

معظم الناس يحملون بكتيريا المكورات العقدية الرئوية في الأنف والحنجرة. وتنتشر هذه البكتيريا عن طريق القطرات من الفم والأنف مثل السعال والعطس أو عن طريق الاتصال مع المواد الملوثة بالرذاذ المصاب.

تهاجم المكورات الرئوية أجزاء مختلفة من الجسم. على سبيل المثال:

- إذا دخلت بكتيريا المكورات الرئوية إلى مجرى الدم تُسمى تجرثم
- إذا هاجمت جزء معين من الدماغ، تُعرف بالإلتهاب السحايا
- إذا هاجمت بكتيريا المكورات الرئوية الرئتين، تُعرف بالإلتهاب الرئوي
- إذا أصابت الأذن الوسطى، تُدعى إلتهاب الأذن الوسطى

لقاح المكورات الرئوية

لقد تبين بأن لقاح الأطفال هو فعال بنسبة 100 في المائة تقريباً ضد أشكال حادة من مرض المكورات الرئوية. ولكن هناك أكثر من 90 سلالة من مرض المكورات الرئوية. إن لقاح واحد من المكورات الرئوية يغطي السلالات التي تسبب 80 في المائة إلى 90 في المائة من حالات مرض المكورات الرئوية الحادة. يُعطى أيضا لقاح آخر من المكورات الرئوية المناسب للأطفال الأكبر سناً إذا كان الطفل لديه حالة طبية كامنة، حيث أنه يحتوي على سلالات أكثر للحماية من الإلتهابات الرئوية. تحتوي اللقاحات على مكونات غير نشطة من بعض سلالات بكتيريا المكورات الرئوية لتحفيز الإستجابة المناعية.

من هم المؤهلين للحصول على اللقاح المجاني؟

- جميع الرضع في الشهر الثاني والشهر الرابع والشهر الثاني عشر من العمر

- مريض في يوم التطعيم
 قد عانى من رد فعل حاد لأي لقاح
 لديه حساسية تجاه أي من مكونات اللقاح

المزيد من المعلومات

لمزيد من المعلومات ابحثوا عن "تطعيم الأطفال" على
www.betterhealth.vic.gov.au

للحصول على النسخ المترجمة لهذه الوثيقة، انتقلوا إلى
www.healthtranslations.vic.gov.au

لمزيد من المعلومات حول برنامج التطعيم الوطني ، يرجى زيارة
www.immunise.health.gov.au

©حقوق الطبع والنشر لوزارة الصحة عام 2010. بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا، 50
Lonsdale Street, Melbourne.
كانون الثاني/يناير 2011 (1011012) PH616 .



**Translating and
interpreting service
Call 131 450**