

مرض نوموکوکی طفولیت

Dari

- اطفال تا سن پنج سالگی با عوامل خطر طبی که آنان را در معرض بیشتر عفونت نوموکوکی قرار میدهند. این اطفال به دوزهای اضافی واکسین نوموکوکی در سن شش ماهگی و در چهار و پنج سالگی نیاز دارند.

لطفا با داکتر خود در مورد امراض زیر زمینه ذیل صحبت کنید:

- عفونت HIV
- سرطانهای خون
- سیستمیک فیروزیس
- نشت CSF
- شنت داخل جمجمه
- کاشت حلزونک گوش داخلی
- نقص سیستم ایمنی بدن به علت مرض، دوا یا تداوی
- اختلال در وظایف طحال و یا نداشتن طحال
- سندروم داون
- تمام اطفالی که کمتر از 28 هفتگی حاملگی تولد یافته باشند.
- امراض مزمن قلب، شش، کرده و مرض شکر/ دیابت

عوارض جانبی احتمالی واکسین نوموکوکی

تأثیرات جانبی معمول

- درد، سرخی و پندیدگی در جای زرق
- تب خفیف

تأثیرات جانبی نهایت کمیاب

- عکس العمل شدید حساسیت

اگر عکس العمل خفیف رخ داد، تأثیرات جانبی را میتوان به طریقه های ذیل کاهش داد:

- گذاشتن پارچه مرطوب سرد بر جای دردناک زرق
- نپوشاندن زیاد طفل
- ممکن است به پاراستامول برای کاهش ناراحتی و/یا تب ضرورت گردد (برچسب آنرا برای استفاده درست بخوانید)
- دادن مایعات بیشتر به طفل که بنوشد.

اگر عکس العمل ها شدید یا دوامدار است ویا اگر در مورد طفل خود نگرانی دارید با داکتر یا شفاخانه تماس بگیرید.

برنامه ملی واکسین به تمام اطفال به سن دو، چهار و 12 ماهگی واکسین مجانی نوموکوکی فراهم میکند. اطفال کمتر از پنج سال مبتلا به زیر زمینه بعضی حالات طبی نیز مستحق به دوز اضافی واکسین نوموکوک میباشند.

مرض نوموکوکی

مرض نوموکوکی در اطفال کوچک سبب مرض جدی مانند عفونت خون و حتی مرگ میگردد. طفلی که دارای یک حالت طبی جدی است در معرض خطر بیشتر عفونت تهدید کننده حیات و بستری شدن در شفاخانه میباشد.

تعداد زیادی افراد باکتری استرپتوکوکس نومونیه را در گلو و بینی خود حمل میکنند. این باکتری از طریق قطرات دهن و بینی مانند سرفه کردن و عطسه زدن یا با تماس با اشیای آلوده با قطرات عفونی شده انتشار میابد.

عفونت نوموکوکی اعضای مختلف بدن را مورد حمله قرار میدهد. طور مثال:

- اگر باکتریای نوموکوکی وارد جریان خون شود، به نام باکتریمیا " عفونت خون" یاد میشود.
- اگر به بخش خاصی مغز حمله کند، بنام مننژیت " التهاب سحایا" یاد میشود.
- اگر باکتریای نوموکوکی به شش ها حمله کند بنام نومونیه یاد میشود.
- اگر گوش وسط را عفونی کند بنام عفونت گوش وسط یاد میشود.

واکسین نوموکوکی

نشان داده شده است که واکسین برای اطفال تقریباً 100 فیصد در مقابل اشکال شدید مرض نوموکوکی مؤثر است. اما بیشتر از 90 گونه مرض نوموکوکی وجود دارد. یک واکسین نوموکوکی 80 تا 90 فیصد مواردی را که سبب مرض نوموکوکی شدید میگردد پوشش میدهد. یک واکسین دیگر نوموکوکی که برای اطفال بزرگتر مناسب است، به اطفالی که دچار یک مرض طبی زیر زمینه است نیز داده میشود زیرا این واکسین دارای گونه های بیشتر برای محافظت در مقابل عفونت نوموکوکی میباشد. این واکسین حاوی اجزای غیر فعال بعضی از گونه های باکتریای نوموکوک است تا یک پاسخ ایمنی را تحریک کند.

که برای واکسین مجانی مستحق است؟

- همه اطفال به سن دو، چهار و 12 ماهگی.

چک لیست قبل از واکسین نمودن

در موارد ذیل، قبل از واکسین کردن طفل خود، داکتر یا نرس را آگاه سازید، اگر طفل شما:

- در روز واکسین مریض است
- عکس العمل شدید به واکسین داشته است
- در مقابل هر یک از اجزای واکسین حساسیت داشته باشد.

معلومات بیشتر

برای معلومات بیشتر " واکسین دوره طفولیت" را در

www.betterhealth.vic.gov.au

جستجو کنید.

برای نسخه های ترجمه شده این سند به این آدرس مراجعه کنید :

www.healthtranslations.vic.gov.au

جهت کسب معلومات در مورد برنامه ملی واکسین از

www.immunise.health.gov.au/

بازدید کنید.

© حق نشر محفوظ است به وزارت صحتیه 2010 . تصویب شده توسط حکومت ایالتی وکتوریا.

Lonsdale St, Melbourne.50

PH616 (1011012)2011 جنوری



**Translating and
interpreting service**
Call 131 450