

Penyakit pneumokokus anak-anak

Indonesian

Jadwal Program Imunisasi Nasional menyediakan vaksin pneumokokus gratis untuk semua bayi pada saat berumur dua, empat dan 12 bulan. Anak-anak dibawah umur lima tahun dengan kondisi medis utama juga berhak atas dosis tambahan vaksin pneumokokus.

Penyakit pneumokokus

Penyakit pneumokokus pada anak kecil menyebabkan sakit parah seperti infeksi darah dan bahkan kematian. Anak yang menderita kondisi medis parah berisiko lebih besar akan terkena infeksi yang mematikan dan opname di rumah sakit.

Sebagian besar orang membawa bakteri *Streptococcus pneumoniae* di hidung dan tenggorokan. Bakteri tersebut disebarkan lewat tetesan dari mulut dan hidung seperti batuk dan bersin atau dengan sentuhan dengan barang terkontaminasi oleh tetesan terinfeksi.

Infeksi pneumokokus menyerang berbagai bagian badan. Misalnya:

- Jika bakteri pneumokokus sampai masuk ke aliran darah ini dinamakan bacteraemia
- Jika bakteri ini menyerang bagian spesifik dari otak ini dikenal sebagai meningitis.
- Jika bakteri pneumokokus menyerang paru-paru, ini dikenal sebagai pneumonia
- Jika menginfeksi telinga tengah, ini dinamakan otitis media.

Vaksin pneumokokus

Vaksin untuk anak-anak terbukti hampir 100 per sen efektif terhadap bentuk serius penyakit pneumokokus.

Tetapi ada lebih dari 90 macam bakteri penyakit pneumokokus. Suatu vaksin pneumokokus mencakup macam bakteri yang menyebabkan 80 per sen sampai 90 per sen sebab penyakit pneumokokus yang parah. Ada suatu vaksin pneumokokus yang lain yang cocok untuk anak-anak lebih tua juga diberikan jika anak tadi mempunyai kondisi medis utama, karena vaksin tersebut mengandung lebih banyak macam bakteri yang melindungi atas infeksi pneumokokus. Vaksin ini mengandung komponen non-aktif dari beberapa macam bakteri pneumokokus untuk merangsang respons kekebalan tubuh.

Siapa yang berhak mendapatkan vaksin gratis?

- Semua bayi pada saat berumur dua, empat dan 12 bulan.
- Anak-anak sampai umur lima tahun dengan faktor risiko medis yang menempatkan mereka pada risiko lebih tinggi terhadap infeksi pneumokokus. Anak-anak ini memerlukan dosis ekstra vaksin pneumokokus pada saat berumur enam bulan dan empat sampai lima tahun.

Silakan berbicara kepada dokter Anda untuk mendiskusikan kondisi medis utama seperti:

- Infeksi HIV
- blood malignancies
- cystic fibrosis
- CSF leak
- intracranial shunt
- cochlear implants
- kekurangan kekebalan tubuh karena penyakit, obat-obatan atau perawatan
- fungsi limpa yang cacat atau tidak ada limpa
- sindrom down
- semua bayi yang lahir di bawah usia kehamilan 28 minggu
- penyakit kronis jantung, paru-paru, ginjal dan diabetes.

Efek samping yang mungkin terjadi dari vaksin pneumokokus

Efek samping yang umum

- sakit nyeri, kemerahan dan bengkak pada tempat suntikan
- suhu tingkat rendah

Efek samping yang sangat jarang

- reaksi alergi parah

Jika reaksi ringan terjadi, efek samping dapat dikurangi dengan:

- menaruhkan kain basah dingin pada tepat suntikanyang sakit
- jangan biarkan anak berpakaian berlebihan
- paracetamol mungkin diperlukan untuk mengurangi kurang enak badan dan/atau suhu badan tinggi (cek label untuk pemakaian yang benar)
- berikan anak Anda minum yang banyak.

Jika reaksi parah atau berkepanjangan, atau jika Anda khawatir mengenai anak Anda, hubungilah dokter Anda atau rumah sakit.

Daftar periksa pra-imunisasi

Sebelum Anda membolehkan anak Anda diimunisasi, beritahu dokter atau perawat jika anak Anda

- Sedang tidak enak badan pada hari imunisasi
- Pernah mengalami reaksi parah terhadap suatu vaksin
- memiliki alergi atas suatu komponen vaksin tersebut

Informasi lebih lanjut

Untuk informasi lebih lanjut cari 'imunisasi anak (childhood immunisation)' di www.betterhealth.vic.gov.au

Untuk versi terjemahan dokumen ini, kunjungi www.healthtranslations.vic.gov.au

For Untuk informasi mengenai Program Imunisasi Nasional, kunjungi www.immunise.health.gov.au/

© Copyright Department of Health 2010. Dikuasakan oleh State Government of Victoria, 50 Lonsdale Street, Melbourne.
January 2011. PH616 (1011012)



Translating and
interpreting service
Call 131 450