

Обољење изазвано пнеумококама у детињству

Serbian

План Програма за националну имунизацију омогућава бесплатну вакцинацију свих беба када имају два, четири и 12 месеци. Деца млађа од пет година, која имају неко медицинско стање, такође имају права на додатне дозе вакцине против пнеумококе.

Пнеумококна обољења

Пнеумококно обољење код мале деце изазива озбиљне болести као што су инфекције крви, па чак и смрт. Дете које већ има неко медицинско стање је у већој опасности да добије инфекције опасне по живот и да му треба болничко лечење.

Већина људи у носу и грлу носи бактерију *Streptococcus pneumoniae*. Бактерија се преноси преко ситних капљица из уста и носа, на пример када се кија или кашље, или додиривањем предмета загађених инфицираним честицама.

Инфекције пнеумококом захватају различите делове тела. На пример:

- ако бактерије пнеумококе уђу у крвоток, то се зове бактеремија
- ако је нападнут један део мозга, то је менингитис
- ако бактерија пнеумококе нападне плућа, онда је то пнеумонија (запаљење плућа)
- ако инфицира средње ухо, долази до запаљења средњег уха.

Вакцина против пнеумококе

Показало се да је вакцина за децу скоро 100% ефикасна, када су у питању тешки облици пнеумококних обољења. Међутим, постоји више од

90 врсти пнеумококних обољења. Једна пнеумококна вакцина покрива узрочнике који изазивају 80 до 90 отсто случајева тешких облика пнеумококних обољења. Другачија пнеумококна вакцина, погодна за старију децу, даје им се када већ имају неко друго медицинско стање, јер садржи више састојака који штите од инфекција изазваних пнеумококом. Ова вакцина садржи неактивне компоненте неких видова пнеумококне бактерије, које стимулишу имунитет.

Ко има право на бесплатну вакцинацију?

- Све бебе када наврше два, четири и 12 месеци.
- Деца млађа од пет година која су изложена већој опасности од пнеумококне инфекције, због неких медицинских узрочника. Овој деци је потребна додатна дозе вакцине против инфекције плућа бактеријом пнеумококе (*pneumo coccal vaccine*) када напуне шест месеци и још једна кад су између 4 и 5 година стара.

Обратите се свом лекару за разговор о већ постојећим медицинским стањима као што су:

- ХИВ инфекција (СИДА)
- малигни поремећаји крви
- цистична фиброза
- цурење мождано-кичмене течности
- дренажа унутрашњости лобање (intracranial shunt)
- електронски апарати за слух уграђени хируршким путем (cochlear implants)
- ослабљен имунитет због болести, лекова или лечења
- оштећена функција слезине или ако је одстрањена
- Даунов синдром
- сва новорођенчад рођена пре 28 недеља трудноће
- хронично обољење срца, плућа, бубрега и шећерна болест.

Могуће нежељене последице вакцине против пнеумококе

Уобичајене нежељене последице

- Бол, црвенило и отеклина на месту где је дата вакцина
- Благо повишена температура.

Изузетно ретка нежељена последица

- јака алергијска реакција.

Ако се појаве благе реакције, оне могу да се умање ако:

- ставите хладну, влажну облогу на болно место где је дата вакцина
- дете не утопљавате превише
- детету можете дати парацетамол ради умањивања болова и/или високе температуре (у циљу правилне употребе прочитајте упутства на кутији)
- дајете детету да пије више течности.

Ако дође до јаких реакција или се оне не повлаче, или сте забринути за стање свог детета, јавите се вашем лекару или болници.

Листа за проверу пре имунизације

Пре него што дете добије вакцину, реците лекару или медицинској сестри ако:

- Детету није добро на дан имунизације
- Је дете имало јаку реакцију на било коју примљену вакцину
- Је дете алергично на неки од састојака вакцине.

Додатне информације

За више информација претражите под 'childhood immunisation' (имунизација деце) на www.betterhealth.vic.gov.au

За преведене верзије овог документа видите на www.healthtranslations.vic.gov.au

За информације о Националном програму имунизације видите на www.immunise.health.gov.au/

© Ауторска права: Министарство здравља 2010. година.
Одобрила Влада Викторије, 50 Lonsdale Street, Мелбурн.
Октобар 2018. РН616



Translating and
interpreting service
Call 131 450