

នីតិវិធីការពន្ធតកូន - ដោយការវះកាត់

ការពន្ធតកូនដោយការវះកាត់ គឺជាវិធីមួយដែលអ្នកអាចបញ្ចប់ការមានផ្ទៃពោះដោយចេតនា

ជំហានដំបូង គឺត្រូវកំណត់ការណាត់ជួបសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ។ ក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់នេះ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹង៖

- បញ្ជាក់ថា តើនីតិវិធីនេះវាសមស្របសម្រាប់អ្នកឬក៏អត់
- ពន្យល់ពីដំណើរការនៃការពន្ធតកូនដោយការវះកាត់
- រៀបចំការធ្វើតេស្តអេកូ និងឈាមពេលណាមានតម្រូវការ
- ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសំណុំបែបបទយល់ព្រមមួយដើម្បីចុះហត្ថលេខា ប្រសិនបើអ្នកបន្តទៅមុខ
- ធ្វើការរៀបចំការពន្ធតកូន។

នៅតាមគ្លីនិកមួយចំនួន នីតិវិធីការពន្ធតកូនកើតឡើងក្នុងថ្ងៃពិគ្រោះយោបល់ដូចគ្នា។ កន្លែងខ្លះទៀត គឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃផ្សេងទៀត។

ការរៀបចំពន្ធតកូនដោយការវះកាត់

- កុំដក់បារី ពិសាអាហារ ឬផឹកភេសជ្ជៈ (សូម្បីតែទឹក) សម្រាប់រយៈពេលប្រហែលប្រាំមួយម៉ោងមុនពេលវះកាត់។ នេះគឺសម្រាប់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចាក់ថ្នាំស្លឹក។
- រៀបគម្រោងទៅគ្លីនិកឱ្យបានមុនយ៉ាងហោចណាស់ពីរថ្ងៃម៉ោង។
- យកមកជាមួយនូវ៖
 - ទ្រនាប់រដូវ
 - លិខិតអ្នកជំនាញត្រូវបញ្ជូនរបស់អ្នក (បើមានតម្រូវការ)
 - ប័ណ្ណកម្មវិធី Medicare របស់អ្នក
 - ប័ណ្ណថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នក (ប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធ) និង
 - អ្វីផ្សេងទៀតដែលគ្លីនិកបានស្នើសុំ។
- រៀបចំឱ្យមាននរណាម្នាក់ដើម្បីមកជីកអ្នកទៅផ្ទះវិញ។

ថ្នាំស្លឹកសម្រាប់ការពន្ធតកូន

អាស្រ័យលើគ្លីនិក ការចាក់ថ្នាំស្លឹកសន្សំសម្រាប់នីតិវិធី អាចទាក់ទិននឹង៖

- ការចាក់ថ្នាំស្លឹកឱ្យសន្សំ - អ្នកមិនដឹងខ្លួនទេក្នុងអំឡុងពេលវះកាត់
- ដាក់ឧស្ម័នអុកស៊ីដ (nitrous oxide) - ដើម្បីឱ្យគេងតិចៗ (ដែលអ្នកនៅដឹងខ្លួន ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ងងឹយគេងដោយសារថ្នាំសណ្តាំ និងស្ងប់ស្ងាត់)
- ការចាក់ថ្នាំស្លឹកនៅនឹងកន្លែង - ការចាក់ថ្នាំស្លឹកចូលទៅក្នុងកស្សនរបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើឱ្យកន្លែងនោះស្លឹក ឬ
- ការចាក់ថ្នាំស្លឹកនៅនឹងកន្លែង ដោយប្រើថ្នាំសណ្តាំមានអារម្មណ៍ងងឹយគេង។

នីតិវិធីការពន្ធតកូនដោយការវះកាត់

នីតិវិធីពន្ធតកូនដោយការវះកាត់ភាគច្រើនត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើ 'ការបឺត (ការបូម) ចេញ' ហើយតាមធម្មតា វាចំណាយពេលតិចជាង១៥នាទី។

នីតិវិធីមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

- កស្សនរបស់អ្នក ត្រូវបានបើកពង្រីកជាលំដាប់។
- បន្ទាប់មក គេសឹកបំពង់ស្តើងមួយចូលទៅក្នុងស្សនរបស់អ្នក។
- ការមានផ្ទៃពោះត្រូវបានយកចេញដោយការបឺតយ៉ាងថ្មីមស្រាល។
- ឧបករណ៍មួយហៅថា ប្រដាប់កោស ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីពិនិត្យថាតើស្សនវានៅស្អាតទេ។

បន្ទាប់ពីការពន្ធតកូនដោយការវះកាត់

ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតមានជំងឺចាញ់ សម្រាប់រយៈពេលពីរបីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការវះកាត់របស់អ្នក (ឬពីរបីថ្ងៃក្រោយពេលឈប់ហូរឈាម)៖

- ងូតទឹកផ្តាឈូក ជំនួសការងូតទឹកក្នុងអាង
- ជៀសវាងការរួមភេទ
- ជៀសវាងការហែលទឹក
- ប្រើទ្រនាប់រដូវ ជំនួសឆ្នុកឃាត់ឈាមរដូវ។

ពេលណាត្រូវស្វែងរកជំងឺប្រព្រឹត្តិ បន្ទាប់ពីការពន្ធតកូន

អ្នកនឹងមានការណាត់ជួបតាមដានដាច់ខាតពីរបីសប្តាហ៍ក្រោយមក ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។

សូមទៅជួបគ្លីនិក វេជ្ជបណ្ឌិត ឬមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗ ប្រសិនបើ៖

- ការហូរឈាមរបស់អ្នកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
- អ្នកមានគ្រុនក្តៅខ្លួន
- អ្នកការរមួលសាច់ដុំ ឬការឈឺចាប់ពោះ (ក្បាលពោះ) យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

ផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំ និងផលវិបាកនៃការពន្ធតកូនដោយការវះកាត់

ផលវិបាកមានតិចតួច ប៉ុន្តែកើតឡើងក្នុងចំនួនប្រហែលបីភាគរយនៃការពន្ធតកូនដោយការវះកាត់។ ការពន្ធតកូនបានកើតឡើងក្នុងត្រីមាសទីមួយ ដែលការពន្ធតកូនដោយការវះកាត់ភាគច្រើន មានផលវិបាកតិចតួច។

ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃការពន្ធតកូនដោយការវះកាត់គឺមិនធម្មតាទេ ប៉ុន្តែអាចរួមបញ្ចូលដូចខាងក្រោមនេះ៖

ផលវិបាក	រោគសញ្ញា ឬផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំ	អ្វីដែលត្រូវធ្វើ
ការហូរឈាម (ការហូរឈាមយ៉ាងខ្លាំង អាចបង្ហាញថាការពន្ធតកូនមិនបានធ្វើពេញលេញ)	<ul style="list-style-type: none"> • ការហូរឈាមដែលអាចសើមជោគទ្រនាប់រដូវធំ ច្រើនជាងពីរ ក្នុងមួយម៉ោង អស់រយៈពេលជាងពីរម៉ោង • ហូរចេញកំណកឈាមទំហំប៉ុនផ្លែក្រូចឆ្មារតូច • មានអារម្មណ៍ខ្សោយ ឬខ្សោយចង់សន្លប់ 	<ul style="list-style-type: none"> • ស្វែងរកការយកចិត្តទុកដាក់ខាងវេជ្ជសាស្ត្រជាបន្ទាន់ • ហៅលេខ ០០០ សម្រាប់ថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬទៅមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតអ្នកបំផុត (កុំបើកបរដោយខ្លួនឯង រៀបចំឱ្យនរណាម្នាក់ដឹកអ្នក) • អាចតម្រូវការព្យាបាលដោយប្រើប្រដាប់បូមកោសសម្អាតស្សន។ • អាចតម្រូវការចាក់បញ្ចូលឈាម (វាកម្រណាស់)។
ការកើតជំងឺចាញ់	<p>អាចកើតមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> • ការឈឺចុករមួលក្រពើ ឬការឈឺចុកពោះ (ក្បាលពោះ) 	<ul style="list-style-type: none"> • ស្វែងរកការយកចិត្តទុកដាក់ខាងវេជ្ជសាស្ត្រជាបន្ទាន់ • ទៅជួបគ្លីនិក វេជ្ជបណ្ឌិត ឬមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យរបស់អ្នកភ្លាមៗ ដើម្បីព្យាបាលដោយថ្នាំផ្សេងៗ

ផលវិបាក	រោគសញ្ញា ឬផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំ	អ្វីដែលត្រូវធ្វើ
	<ul style="list-style-type: none"> ការហូរចេញវត្តរាវពីទ្វារមាសមិនប្រក្រតី គ្រុនក្តៅខ្លួន ការហូរឈាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ នឿយហត់ ចុះរាគ ការក្អួតចង្កោរ។ 	
<p>ការងារបួសដល់ស្បូន</p> <p>នេះគឺកម្រកើតមានណាស់ដោយហេតុថាការពន្លតកូនដោយការវះកាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយវេជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់ដែលមានបទពិសោធន៍</p>	<ul style="list-style-type: none"> ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយវេជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់។ 	<ul style="list-style-type: none"> វានឹងត្រូវបានសម្គាល់ដឹង និងព្យាបាលភ្លាមៗដោយវេជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់។
<p>ការងារបួសដល់ ឬការចុះខ្សោយនៃកស្បូន</p> <p>នេះគឺកម្រណាស់ពីព្រោះការពន្លតកូនដោយការវះកាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យវះកាត់ដែលមានបទពិសោធន៍</p>	<ul style="list-style-type: none"> នេះអាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាក្នុងការមានផ្ទៃពោះនាពេលអនាគត។ 	<ul style="list-style-type: none"> ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនាពេលអនាគត គ្រូពេទ្យជំនាញខាងភាគស្ត្រីនឹងផ្តល់ជំនួយ។

ព័ត៌មានបន្ថែម

តារាងព័ត៌មាននេះគឺជាតារាងព័ត៌មានមួយក្នុងចំណោមតារាងព័ត៌មានបី អំពីការពន្លតកូនដែលមានដាក់នៅក្នុងសៀវភៅ Health Translations Directory។ សូមមើលផងដែរ:

- នីតិវិធីពន្លតកូន - ដោយការប្រើថ្នាំពេទ្យ
- ការពន្លតកូន។

អនុញ្ញាត និងបោះពុម្ពផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវិចចូរ៉េ 1 Treasury Place, Melbourne។
 © រដ្ឋវិចចូរ៉េ ក្រសួងសុខាភិបាល និងសេវាកម្មមនុស្ស ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
 អាចទទួលយកបាននៅតាមរូបសែច <<http://healthtranslations.vic.gov.au/>>