

# ගලපටලය පිටගැස්ම, කක්කල්කැස්ස, හෙපටයිටිස් බී, බාලකපක්ෂාගාත රෝගය හා රැඹරගත ඉන්ගලුවැන්නා බී වර්ගය (Hib)

ප්‍රතිශක්තිකරණ තොරතුරු  
Sinhala - English



ගලපටලය, පිටගැස්ම, කක්කල්කැස්ස හෙපටයිටිස් බී, බාලකපක්ෂාගාත රෝගය හා රැඹරගත ඉන්ගලුවැන්නා බී වර්ගය (Hib) සඳහා වයස මාස දෙකේ, හතරේ හා හයේ ප්‍රදරුවන ජාතික ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන මගින් නොමිලයේ ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් සපයනු ලැබේ.

The National Immunisation Program provides free diphtheria, tetanus, whooping cough, hepatitis B, polio and Hib vaccine to infants at two months, four months and six months of age.

## ගලපටලය

ගලපටලය සෑදෙන්නේ මුඛයේ, උගුරේ හා නාසයේ හමුවන බැක්ටීරියාවක් මගිනි. ගලපටලය මගින් උගුර තුළ හා උගුර වටා වර්ධනය වන පටලයක් ඇති කරයි. මේ මගින් ගිලීමේ හා හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා ඇතිකරණ අතර හුස්ම හිරවීම පවා ඇතිකළ හැකිය.

මෙම බැක්ටීරියාව මගින් සිරුර පුරා පැතිරිය හැකි විසක් නිපදවන අතර එමගින් පක්ෂාගාතය, හෘදය අකර්මන්‍යවීම වැනි බරපතළ සංකීර්ණතා ඇති කළ හැකිය. ගලපටලය වැළ දෙන්නන්ගෙන් සියයට දහයක් පමණ එමගින් මිය යති.

ගලපටලය ආසාදිත පුද්ගලයෙකුගේ කැස්ස හා කිවිසුම් මගින් බෝවිය හැකිය.

## පිටගැස්ම

වැලි, දූවිලි සහ පොහොරවල ඇති බැක්ටීරියාවක් මගින් පිටගැස්ම වැළදේ. අල්පෙන්ති තුවක් පමණ කුඩා වූ තුවාලයක් මගින් බැක්ටීරියාව සිරුරට ඇතුළු විය හැකිය. එය පුද්ගලයෙකුට ගත් තවත් පුද්ගලයෙකුට පැතිරිය නොහැකිය.

පිටගැස්ම බොහෝවිට මාරාන්තික රෝගයකි. ශ්‍රීකාන්ත පද්ධතිය ආක්‍රමණය කරන එය පළමුව බෙල්ලට හා හකුටලට දැනෙන මස්පිඬු වේදනා / අක්‍රීයකිරීම ඇතිකරයි. පිටගැස්ම, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා මෙන්ම, වේදනාකාරී වලිප්පුව මෙන්ම අසාමාන්‍ය හෘද ස්පන්දන රීදීමක් කරා යොමු කරයි.

එළදායි ප්‍රතිශක්තිකරණය හේතුවෙන් පිටගැස්ම දැන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ විරලය. එහෙත් එය කිසිදුක ප්‍රතිශක්තිකරණයට ලක්නොවූ වැඩිහිටියන්ට හා උත්තේජක ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නතය ලබා නොගත් වැඩිහිටියන්ටත් තවමත් වැළදේ.

## කක්කල් කැස්ස

කක්කල් කැස්ස වායු මාර්ගය ( ආශ්වාස මාර්ගය) සහ හුස්ම ගැනීම කෙරෙහි බලපාන, විශාල වශයෙන්ම බෝවෙන රෝගයකි. මෙම රෝගය ඉතා තදින් ගැස්ම සහිත ප්‍රහාරාත්මක කැස්සක් ඇති කරයි. මෙම ප්‍රහාරාත්මක කැස්ස අතරතුර දරුවා වෙහෙසින් මුව අඟ හුස්ම අල්ලයි. මෙම ප්‍රහාරාත්මක කැස්සට පසුව බොහෝවිට අවසානයේ වමනය ඇතිවේ. එමෙන්ම කැස්ස මාස ගණනක් කල් පැවතිය හැකිය.

## Diphtheria

Diphtheria is caused by bacteria which are found in the mouth, throat and nose. Diphtheria causes a membrane to grow around the inside of the throat. This can make it difficult to swallow, breathe and can even lead to suffocation.

The bacteria produce a poison which can spread around the body and cause serious complications such as paralysis and heart failure. Around 10 percent of people who contract diphtheria die from it.

Diphtheria can be caught through coughs and sneezes from an infected person.

## Tetanus

Tetanus is caused by bacteria which are present in soils, dust and manure. The bacteria can enter the body through a wound which may be as small as a pin prick. Tetanus cannot be passed from person to person.

Tetanus is an often fatal disease which attacks the nervous system. It causes muscle spasms first felt in the neck and jaw muscles.

Tetanus can lead to breathing difficulties, painful convulsions and abnormal heart rhythms.

Because of the effective immunisation, tetanus is now rare in Australia, but it still occurs in adults who have never been immunised against the disease or who have not had their booster vaccines.

## Whooping cough

Whooping cough is a highly contagious disease which affects the air passages and breathing. The disease causes severe coughing spasms. Between these spasms, the child gasps for breath. Coughing spasms are often followed by vomiting and the cough can last for months.



වයස මාස 12 ට වඩා අඩු ළදරුවන්ට කක්කල්කැස්ස සෑදුන විට එය ඉතා බරපතළ වන අතර රෝහලට ඇතුළත් කිරීම බොහෝවිට අවශ්‍ය වේ. කක්කල්කැස්ස, රුධිර වහනය (ලේ ගැලීම්), වලිප්පුව, නිව්මෝනියාව, සිහිසුන්වීම, මොළේ ඉදිමීම, මොළයට හිත‍්‍ය හානි වීම, සහ දීර්ග කාලීන පෙනහළු හානිවීම වැනි තවත් සංකීර්ණ ගැටලු රාශියකට මගපෙන්වයි. කක්කල් කැස්ස වැළඳුණු වයස මාස හයකට වඩා අඩු ළමුන් 200 දෙනෙකුගෙන් එක්කෙනෙකු වත් ආසන්න වශයෙන් මිය යති.

කක්කල් කැස්ස ආසාදිත පුද්ගලයෙකුගේ කැස්ස හා කිවිසුම් මගින් බෝවිය හැකිය.

## හෙපටයිටිස් බී. (Hepatitis B)

හෙපටයිටිස් බී වෛරසය අක්මාවට බලපාන අතර එමගින්:

- උණ
- වමන ගතිය හා පාවනස
- තෙහෙට්ටුව/ මහන්සිය
- තද වර්ණිත මුත්‍රා සහ කහපාට හම
- ඇතිකළ හැකිය.

හෙපටයිටිස් බී වෛරසය සාමාන්‍යයෙන් ආසාදිත පුද්ගලයෙකුගේ ශාරීරික තරලයන් (ලේ, කෙළ, ශුක්‍රධාතුව) හා ගැටීමෙන් / ස්පර්ශ වීමෙන් හෝ දරු ප්‍රසූතියේදී මවගෙන් ළදරුවෙකුට වැළඳේ, ආසාදිත කුඩා දරුවන්ගෙන් බොහෝමදෙනෙකු හෙපටයිටිස් බී වෛරසය වාහකයන් බවට පත්වෙති. එනම් ඔවුන්ට රෝග ලක්‍ෂණ නැති නමුත් ඔවුන් මගින් අන් අයට මේ රෝගය පැතිරිය හැකිය.

ඔබගේ දරුවා හෙපටයිටිස් බී රෝගය ආසාදනය වී වාහකයෙක් වුවහොත් ඔවුන්ට ජීවිතයේ පසු කාලයක අක්මා රෝග හා පිළිකා සෑදීමේ වැඩි අවදානමක් ඇති වේ.

## බාලකපක්‍ෂාගාතරෝගය

බාලකපක්‍ෂාගාතරෝගය අඩුවශයෙන් හෝ බරපතළ ලෙස රෝගලක්‍ෂණ ඇතිකරයි. එය ආහාර ජීරණ පද්ධතිය හා ස්නායු පද්ධතිය වෙත බලපාන වෛරසයකි. එය උණ, වමනය, මස්පිඬු තදවීම ඇතිකරන අතර ස්නායු පද්ධතියට වන තද බලපෑම් තුළින් හිත‍්‍ය කොරවීම පවා ඇතිකළ හැකිය. මෙම රෝගය හුස්ම ගැනීමේ හා ගිලීමේ මාංශ පේශීන් අක්‍රීය කිරීමෙන් මරණය ඇතිකළ හැකිය. බාලකපක්‍ෂාගාතරෝගය සෑදුණ අයගෙන් සියයට දෙකත්, පහත් අතර ප්‍රමාණයක් මැරෙන අතර බේරෙන සියලුම රෝගීන්ගෙන් අඩක් පමණ හිත‍්‍ය අශක්‍යයෙන් ජීවා විඳිති.

ආසාදිත රෝගියෙකුගේ අඟුළුවලින්, ආහාර, ජලය හෝ අත් දූෂණය වීමෙන් පක්‍ෂාගාතරෝගය වැළඳේ.

## රුධිරගත ඉන්ගලුවැන්සාව (Hib)

1993 දී ක්‍රමානුකූල ප්‍රතිශක්තිකරණ Hib එන්නත් හඳුන්වාදීමට පෙර වයස අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන් අතර ඉතාම බහුල ජීවිතයට අන්තරායකාරී ආසාදනය වූයේ රුධිරගත ඉන්ගලුවැන්සාවය (Hib). ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත වයස අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන් අතර බහුලව පැවතුන අතර, අවුරුදු 5 ට පසුව එය හටගත්තේ කළාතුරකිනි. එහි නම කෙසේවෙතත්, මෙය ඉන්ගලුවැන්සාවට කිසිම අයුරකින්

Whooping cough is most serious in babies under 12 months of age and often requires admission to hospital. Whooping cough can lead to complications such as haemorrhage, convulsions, pneumonia, coma, inflammation of the brain, permanent brain damage and long term lung damage. Around one in every 200 children under six months of age who catches whooping cough will die.

Whooping cough can be caught through coughs and sneezes from an infected person.

## Hepatitis B

The hepatitis B virus affects the liver and can cause:

- Fever
- Nausea and diarrhoea
- Tiredness
- Dark urine and yellow skin

Hepatitis B virus is usually spread through contact with the body fluids (blood, saliva, semen) of an infected person, or from mother to child at birth. Most young children who catch the hepatitis B virus become ‘carriers’. This means they can pass the disease onto other people even if they don’t have symptoms.

If your child contracts hepatitis B and becomes a ‘carrier’, they will have an increased risk of liver disease and cancer later in life.

## Polio

Polio may cause mild symptoms or very severe illness. It is a virus which affects the digestive and nervous systems. It causes fever, vomiting and muscle stiffness and can affect the nerves, causing permanent crippling.

The disease can paralyse breathing and swallowing muscles, leading to death. Between two and five percent of people with polio die from it and about half of all patients who survive suffer permanent paralysis.

Polio can be caught if the faeces of an infected person contaminates food, water or hands.

## Hib

Hib disease was the most frequent cause of life threatening infection in children under five years of age before the introduction of routine Hib vaccines in 1993. The incidence of Hib infection before a

සම්බන්ධ නැත. රුධිරගත ඉන්ගුලුවන්සාව යනු සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස මාර්ගයේ ජීවත්වන බැක්ටීරියාවකි. රුධිරගත ඉන්ගුලුවන්සාව (Hib) මගින් ඇති කළ හැකිය.

- මෙනින්ජයිටිස්, මොළය වසා ඇති පටලයේ ඇති ආසාදනය වීම.
- එපිග්ලෝටිටිස් (epiglottitis) අපීනජීවිකාව ඉදිමුම, උගුර ඉදිමීමෙන් හටගන්නා හුස්ම ගැනීම අවහිරවීම.
- සෙප්ටික් ආතරයිටිස් (septic arthritis ), හන්දියක ආසාදනය වීම.
- සෙලුලයිටිස් (Cellulitis )/ පඬක ඉදිමුම, සාමාන්‍යයෙන් මුහුණේ හමු යට පඬක ආසාදනය වීම
- නිවීමෝනියාව.

මෙම තත්වයන් ඉතා ඉක්මනින් වර්ධනය විය හැකි අතර ප්‍රතිකාර නොකර මගහැරියාත් සීඝ්‍රයෙන් මරණය ප්‍රභාවය හැකිය.

## ගලපටලය, පිටගැස්ම, කකුල්කැස්ස, බාලකපණාගාත රෝගය, හෙපටයිටිස් බී, බාලකපණාගාත රෝගය හා Hib ප්‍රතිශක්තිකරණය

ගලපටලය පිටගැස්ම, කකුල්කැස්ස, බාලකපණාගාත රෝගය, හෙපටයිටිස් බී හා Hib Infanrix hexa<sup>®</sup> නමැති සුරක්ෂිත හා ඵලදායී ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් සංයෝජනයක් මගින් පිටුදැකිය හැකිය. යහපත් ආරක්ෂාවක් සැපයීම සඳහා එන්නත් කිහිපයක් ලබාදීම අවශ්‍යය. Infanrix hexa<sup>®</sup> ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත තිහි හානි නොවන පරිදි විකරණය කරන ලද කුඩා ප්‍රමාණයක ගලපටල හා පිටගැස්ම මුලක අඩංගු වේ. Infanrix hexa<sup>®</sup> ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නතෙහි පිරිසිදු කරන ලද කකුල්කැස්ස බැක්ටීරියාවෙහි කොටස් හා ක්‍රියා විරහිත කරන ලද හිබ් ගෙ වරසයේ කොටසක් හා ක්‍රියා විරහිත කරන ලද, බාලකපණාගාත වෛරස වර්ග 3 ක් හා හිබ් සීනි අඩංගුය. මෙම ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නතෙහි ඇලුමිනියම්, ලුණු, ප්‍රතිදේහ හා සුරක්ෂක අඩංගු විය හැකිය.

## පුරව ප්‍රතිශක්තිකරණ පිරික්සුම් ලේඛනය

ඔබගේ දරුවා ප්‍රතිශක්තිකරණය කිරීමට පෙර පහත සඳහන් කිසිවක් අදාළ වේ නම් වෛද්‍යවරයාට හෝ හේදියට පවසන්න.

- ප්‍රතිශක්තිකරණ ලබාදෙන දිනයේ අසනීපයෙන් සිටියේද? (අංශක 35.5 ට වඩා උණ)
- අතීතයේදී කුමන හෝ එන්නතකට දැඩි ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇතිවීද?
- කුමන හෝ ප්‍රතිශක්තිකරණ සංඝටකයකට දැඩි අසාත්මිකතාවක් තිබීම (උදාහරණ වශයෙන් neomycin)

vaccine was available was highest in children under five years of age and rarely occurred after five years of age. Despite its name it is not related in any way to influenza. Haemophilus influenzae is a bacteria which lives normally in a person’s upper respiratory tract.

Hib disease may cause:

- Meningitis, an infection of the membrane covering the brain
- Epiglottitis, swelling of the throat which can block breathing
- Septic arthritis, infection of a joint
- Cellulitis, infection of the tissue under the skin, usually on the face
- Pneumonia.

These conditions can develop quickly and if left untreated, they can rapidly cause death.

## Diphtheria, tetanus, whooping cough, hepatitis B, polio, and Hib immunisation

Diphtheria, tetanus, whooping cough, polio, hepatitis B and Hib can be prevented with a safe and effective combination vaccine called Infanrix hexa<sup>®</sup>. Several injections are needed before good protection is provided.

The Infanrix hexa<sup>®</sup> vaccine contains a small amount of diphtheria and tetanus toxins, which are modified to make them harmless. It also contains purified parts of the pertussis bacterium, an inactivated part of the hepatitis B virus, three types of inactivated polio viruses and Hib ‘sugars’. The vaccine also contains a small amount of aluminium salts, small amounts of antibiotics, preservative and may also contain yeast proteins.

## Pre-immunisation checklist

Before your child is immunised, tell the doctor or nurse if any of the following apply:

- Are unwell on the day of immunisation (temperature over 38.5 °C)
- Have had a severe reaction to any vaccine
- Have a severe allergy to any vaccine component (for example, neomycin)

# ගලපටලය පිටගැස්ම, කකකල්කැස්ස, හෙපටයිටිස් බී, බාලකපණාගාත රෝගය හා හිබ් (Hib) ප්‍රතිශක්තිකරණය නිසා ඇතිවියහැකි අතුරු ආබාධ

ගලපටලය පිටගැස්ම, කකකල්කැස්ස, හෙපටයිටිස් බී, බාලකපණාගාත රෝගය හා හිබ් (Hib) ප්‍රතිශක්තිකරණය එන්නත් මගින් සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවන් එම රෝගවලින් සිදුවන ගැටලුවල වාර ගණනට වඩා අඩුය.

## සාමාන්‍ය අතුරු ප්‍රතිඵල

- නොරිස්සුම් සහගත බව, ඇසීම, සසලබව හා සාමාන්‍ය අසතුට
- නිද්‍රමන හා මහන්සිය
- මද උණ
- එන්නත් විදින ලද ස්ථානය අවට ඇතිවන වේදනාව, රතු වීම හා ඉදිමීම
- එන්නත් විදින ලද ස්ථානයේ තාවකාලිකව ඇතිවන ගැටිත්ත.

## ඉතා කළාතුරුකින් ඇතිවන අතුරු ප්‍රතිඵල

- මදගාම් අධි ප්‍රතිචාර සිදුවීම (Hypotonic - hyporesponsive episode (HHE)). ප්‍රතිචාර නොදැක්වීමේ ලක්ෂණ පෙන්වනු ලබන අතර, කොරගැසීම හා ප්‍රතිචාර නොදැක්වීමේ ලක්ෂණ පෙන්වනු ලබන අතර, ප්‍රතිශක්තිකරණය කිරීමෙන් පසු සිට පැය 48 ක කාලය තුළ මෙය සිදු විය හැකිය. මේ මුළු සිදුවීම මිනිත්තු කිහිපයක සිට පැය 36 ක් දක්වා පැවතිය හැකිය. මේ HHE සහිත ප්‍රතිචාර පසු අධ්‍යයනය කිරීම මගින් පෙන්වන්නේ දිගු කාලීන ස්නායු වේදි හෝ අනෙකුත් අතුරු ප්‍රතිඵල නොමැති බවය.
- දැඩි අසාත්මික ප්‍රතික්‍රියා

සුළු ප්‍රතික්‍රියා ඇතිවුවහොත් එවා පවතින්නේ දිනක හෝ දෙකක පමණි. අතුරු ආබාධ අඩුකරගතහැක්කේ,

- අමතර දියර පානය කිරීමෙන්
- පමණට වඩා ඇදුම් ඇන්දවීමෙන් වැළකීමෙන්
- සීතල තෙත රෙද්දක් එන්නත් කරණ ලද ස්ථානය මත තැබීමෙන්.
- අපහසුතා අඩුකිරීම සඳහා ඔබගේ ප්‍රදරුවාට පැරසිටමෝල් ලබාදීමෙන්.

ප්‍රතික්‍රියා දැඩි වන්නේ නම් හෝ කල් පවතින්නේ නම් හෝ ඔබ කණස්සල වන්නේ නම් ඔබගේ වෛද්‍යවරයා හෝ රෝහල හා සම්බන්ධ වන්න.

## වැඩිදුර තොරතුරු

පහත සඳහන් වෙබ් අඩවි වැඩිමහත් තොරතුරු හා මූලාශ්‍ර ලබාදෙයි.

[www.health.vic.gov.au/immunisation](http://www.health.vic.gov.au/immunisation)  
[www.immunise.health.gov.au](http://www.immunise.health.gov.au)

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත රජයෙන් අනුමැතිය ලැබී ඇත.  
50 ලොන්ස්ඩේල් වීදිය, මෙල්බර්න්.  
ජනවාරි 08.

# Possible side effects of diphtheria, tetanus, whooping cough, hepatitis B, polio and Hib vaccine

Reactions to diphtheria, tetanus, whooping cough, hepatitis B, polio and Hib vaccine are much less frequent than the complications of the diseases.

## Common side effects

- Irritable, crying, unsettled and generally unhappy
- Drowsiness or tiredness
- Low grade fever
- Soreness, redness and swelling at the injection site
- A temporary small lump at the injection site

## Extremely rare side effects

- Hypotonic-hyporesponsive episode (HHE). Infant may show signs of paleness, limpness and be unresponsive. This may occur one to 48 hours following vaccination. The whole episode may last from a few minutes to 36 hours. Follow-up of children with HHE shows no long-term neurological or other side effects.
- Severe allergic reaction.

If mild reactions do occur, they may last one to two days. The side effects can be reduced by:

- Drinking extra fluids
- Not overdressing
- Placing a cold, wet cloth on the sore injection site
- Giving your child paracetamol to reduce any discomfort (note the recommended dose for the age of your child)

If reactions are severe or persistent, or if you are worried, contact your doctor or hospital.

## Further information

The following websites offer resources and further information:

[www.health.vic.gov.au/immunisation](http://www.health.vic.gov.au/immunisation)  
[www.immunise.health.gov.au](http://www.immunise.health.gov.au)