

Çocukluk pnömokok hastalığı

Turkish

Ulusal Aşılama Programı (National Immunisation Program) iki, dört ve 12 aylık tüm bebeklere ücretsiz pnömokok aşısı sağlar. Beş yaşın altında olup, belli başlı tıbbi riskli rahatsızlıkları olan çocukların da ücretsiz ek pnömokok aşı dozlarına hakları vardır.

Pnömokok hastalığı

Pnömokok hastalığı küçük çocuklarda, kanda enfeksiyon gibi ciddi hastalıklara ve hatta ölüme bile neden olur. Ciddi bir tıbbi rahatsızlığı olan bir çocukta hayati tehlike yaratan enfeksiyon oluşması ve hastaneye yatırılma riski daha yüksektir.

Çoğu kişiler Streptokok pnömoni bakterisini burunlarında ve boğazlarında taşır. Bakteri, öksürme ve hapşırma gibi ağızdan ve burundan damlacıklarla veya enfekte olmuş damlacıklar bulaşmış eşyalarla temas yolu ile yayılır.

Pnömokok enfeksiyonları vücudun farklı bölümlerine hücum eder. Örneğin:

- Pnömokok bakterisi kan dolaşımına girerse, buna bakteriyemi adı verilir
- Beynin belirli bir bölümüne hücum ederse, menenjit olarak bilinir
- Pnömokok bakterisi akciğerlere hücum ederse, pnömoni (zatürree) olarak bilinir
- Orta kulağı enfekte ederse, buna otitis media (orta kulak iltihabı) adı verilir.

Pnömokok aşısı

Çocuklar için olan bir aşının pnömokok hastalığının şiddetli türlerine karşı hemen hemen yüzde 100 etkili

olduğu görülmüştür. Ancak pnömokok hastalığının 90'dan fazla türü vardır. Bir pnömokok aşısı şiddetli pnömokok hastalığının yüzde 80'i ile yüzde 90'ına neden olan türlere karşı korur. Daha büyük çocuklar için olan diğer bir pnömokok aşısı, pnömokok enfeksiyonuna karşı korumak için daha fazla türleri içerdiğinden, belli başlı tıbbi rahatsızlığı olan çocuklara da verilir. Aşılar, bağışıklık tepkisini uyarmak için, pnömokok bakterisinin bazı türlerinin aktif olmayan unsurlarını içerir.

Ücretsiz aşı için kimler hak sahibidir?

- İki, dört ve 12 aylık olan bütün bebekler
- Pnömokok enfeksiyonuna karşı yüksek risk oluşturan tıbbi risk faktörleri olan beş yaşına kadar çocuklar. Bu çocukların altı aylıkken ve dörtle beş yaş arasıyken fazladan pnömokok aşısı dozlarına ihtiyaçları vardır.

Aşağıdaki gibi mevcut bulunan hastalıkları lütfen doktorunuzla görüşün:

- HIV enfeksiyonu
- kanda habis tümör
- kistik fibrozis
- CSF sızıntısı
- kafatasında şönt
- koklear implant
- hastalık, ilaç veya tedavi nedeniyle bağışıklık yetersizliği
- dalak fonksiyonunda bozukluk veya dalak olmaması
- Down sendromu
- 28 haftadan önce doğan bütün bebekler
- Kronik kalp, akciğer, böbrek hastalıkları veya şeker hastalığı.

Pnömonok aşısının olası yan etkileri

© Telif Hakkı Sağlık Bakanlığı 2010. Victoria Eyalet Hükümeti tarafından yetkilendirilmiştir, 50 Lonsdale Street, Melbourne. Ocak 2011. PH616 (1011012)

Yaygın görülen yan etkiler

- aşı yerinde ağrı, kızarıklık ve şişme
- hafif ateş.

Çok nadir görülen yan etkiler

- şiddetli alerjik tepki.

Hafif tepkiler olursa, yan etkiler şu şekillerde hafifletilebilir:

- acıyan aşı yerine soğuk ıslak bir bez koyarak
- çocuğunuzu fazla giydirmeyerek
- ağrıyı hafifletmek ve/veya yüksek ateşi düşürmek için parasetamol gerekebilir (doğru kullanım için etiketini dikkatle okuyun)
- Çocuğunuza içmesi için fazladan sıvı vermek.

Tepkiler şiddetliyse veya geçmiyorsa veya endişeleniyorsanız, doktorunuzla veya hastane ile irtibat kurun.

Aşı öncesi kontrol listesi

Çocuğunuza aşı yapılmadan önce aşağıdaki durumlardan herhangi biri mevcutsa, doktoru veya hemşireyi bilgilendirin:

- Aşı günü iyi değil
- Herhangi bir aşıya şiddetli tepki göstermişti
- Aşının herhangi bir maddesine alerjisi var

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi için www.betterhealth.vic.gov.au adresinden "childhood immunisation (çocukluk dönemi aşılımları)" araması yapın.

Bu belgenin çevrilmiş sürümleri için www.healthtranslations.vic.gov.au adresine gidin.

Ulusal Aşılama Programı hakkında bilgi için www.immunise.health.gov.au/ adresini ziyaret edin.



**Translating and
interpreting service
Call 131 450**