

儿童期肺炎球菌病

全国免疫接种计划为所有两个月、四个月和十二个月大的婴儿提供免费肺炎球菌疫苗。有潜在疾病的五岁以下儿童也符合条件获得额外剂量的肺炎球菌疫苗。

肺炎球菌病

幼儿肺炎球菌病会造成严重疾病（例如血液感染），甚至死亡。有严重疾病的儿童受到致命感染和住院的风险更高。

大多数人的鼻子和咽喉中携带肺炎链球菌。该细菌通过口鼻飞沫（例如咳嗽和打喷嚏）或接触被受感染的飞沫污染的物体而传播。

肺炎球菌感染侵害身体的不同部位。

- 如果肺炎球菌进入血液，则称为菌血症
- 如果它感染脑部的特定部位，则称为脑膜炎
- 如果肺炎球菌感染肺部，则称为肺炎
- 如果它感染中耳，则称为中耳炎。

肺炎球菌疫苗

儿童疫苗经证明几乎能 100%有效预防严重类型的肺炎球菌病。然而，肺炎球菌病有 90 多种菌株。一种肺炎球菌疫苗能涵盖造成 80%到 90%严重肺炎球菌病例的菌株。年龄较大的儿童如果有潜在疾病，还会接种另一种肺炎球菌疫苗，该疫苗含有更多菌株提供针对肺炎球菌感染的保护。疫苗含有一些肺炎球菌菌株的非活性成分，刺激免疫反应。

谁有资格获得免费疫苗？

- 所有两个月、四个月和十二个月大的婴儿。
- 存在医疗风险因素，因此受肺炎球菌感染风险更高的五岁以下儿童。这些儿童需要在六个月以及四到五岁时额外接种肺炎球菌疫苗。

请向医生咨询潜在疾病的情况，例如：

- HIV 感染
- 血癌
- 囊性纤维化病
- 脑脊液漏
- 颅内分流
- 人工耳蜗
- 疾病、药物或治疗造成的免疫缺损
- 脾脏功能受损或无脾脏
- 唐氏综合症
- 出生孕期不满 28 周的所有婴儿
- 心脏、肺部、肾脏慢性疾病，慢性糖尿病。

肺炎球菌疫苗可能的副作用

常见副作用

- 注射部位疼痛、发红和肿胀
- 低烧

极罕见的副作用

- 严重过敏反应。

如果出现轻度反应，可通过以下方法缓解副作用：

- 疼痛的注射部位用湿布冷敷

- 不要给孩子穿太多衣服
- 可能需要用扑热息痛 (paracetamol) 来缓解不适和/或高烧 (查看标签上的正确用量)
- 让孩子多喝水。

如果反应严重或持续不退，或对孩子的状况感到担心，请联系医生或医院。

免疫接种前的检查清单

如果孩子有以下情况，请在孩子接受免疫接种前告诉医生或护士：

- 免疫接种当日身体不好
- 曾对任何疫苗有严重反应
- 对疫苗的任何成分过敏

更多信息

如需更多信息，请访问网站

www.betterhealth.vic.gov.au，搜索“childhood immunisation (儿童免疫接种)”

如需本文件的翻译版本，请访问网站

<http://www.healthtranslations.vic.gov.au>

如需关于全国免疫接种计划的信息，请访问网站

<http://www.immunise.health.gov.au/>

© 2010 年卫生部版权所有。由维多利亚州政府授权，地址：50 Lonsdale Street, Melbourne。2011 年 1 月。PH616 (1011012)



**Translating and
interpreting service
Call 131 450**