

بیماری پنوموکوکی دوران کودکی

Persian

• کودکان تا پنج ساله با عوامل خطر پزشکی که آنها را در معرض خطر بالای عفونت پنوموکوکی قرار می دهد. این کودکان نیاز به دوزهای اضافی واکسن پنوموکوک در شش ماهگی و چهار تا پنج سالگی دارند.

لطفا با دکترتان در مورد شرایط پزشکی زمینه ای زیر صحبت کنید:

- عفونت اچ آی وی
- بدخیمی های خونی
- فیبروز کیستی
- نشت مایع داخل جمجمه ای CSF leak
- سوراخ داخل جمجمه ای intracranial shunt
- کاشت حلزونی
- نقص ایمنی بخاطر بیماری، دارو یا درمان
- کارکرد ناقص طحال یا عدم وجود طحال
- سندرم داون
- همه نوزادانی که در کمتر از 28 هفته بارداری متولد شده اند
- بیماریهای مزمن قلب، ریه، کلیه و دیابت

عوارض جانبی احتمالی بیماری پنوموکوک

عوارض جانبی شایع

- درد، قرمزی و تورم در محل تزریق
- تب با درجه پائین

عوارض جانبی خیلی نادر

- واکنش حساسیت شدید

اگر واکنش خفیف روی بدهد، عوارض جانبی می تواند از راههای زیر کم شود:

- قرار دادن یک پارچه سرد خیس روی درد محل تزریق
- زیاد نپوشاندن فرزندتان
- مسکن ممکن است برای کم کردن ناراحتی و یا تب بالا لازم باشد (برچسب آنرا برای استفاده صحیح چک کنید)
- دادن مایعات اضافی به فرزندتان برای نوشیدن

اگر واکنش ها شدید یا مداوم هستند یا اگر در مورد فرزندتان نگران هستید با دکترتان یا بیمارستان تماس بگیرید.

طرح برنامه ملی ایمن سازی واکسن پنوموکوک رایگان برای همه نوزادان کودکی در دو، چهار و 12 ماهگی فراهم می کند. کودکان زیر پنج سال نیز که شرایط پزشکی زمینه ای دارند برای دوزهای اضافی واکسن پنوموکوک واجد شرایط می باشند.

بیماری پنوموکوکی

بیماری پنوموکوکی در کودکان خردسال سبب بیماری جدی مثل عفونت خون و حتی مرگ می شود. یک کودک دارای شرایط پزشکی جدی در معرض خطر بیشتری نسبت به عفونت تهدید کننده زندگی و بستری شدن می باشد.

اکثر افراد باکتری استرپتوکوک پنومونیا را در بینی و گلو حمل می کنند. این باکتری توسط قطرات دهان و بینی مانند سرفه و عطسه یا تماس با اشیاء آلوده به قطرات عفونی منتقل می شود.

عفونتهای پنوموکوکی به نقاط مختلف بدن حمله می کنند. برای مثال:

- در صورتی که باکتری پنوموکوک وارد جریان خون بشود باکترئمی (bacteraemia) نامیده می شود.
- اگر به بخش خاصی از مغز حمله کند، به عنوان مننژیت شناخته می شود
- در صورتی که باکتری پنوموکوکی به ریه ها حمله کند، به عنوان ذات الریه شناخته می شود
- اگر گوش میانی را آلوده کند، اوتیت گوش میانی نامیده می شود.

واکسن های پنوموکوکی

نشان داده شده است که واکسن کودکان تقریباً 100 درصد در برابر اشکال شدید بیماری پنوموکوکی موثر است. اما بیش از 90 گونه از بیماری پنوموکوکی وجود دارد. یک واکسن پنوموکوکی گونه هایی را تحت پوشش قرار می دهد که باعث 80 درصد تا 90 درصد از موارد شدید بیماری پنوموکوکی هستند. در صورتی که کودک یک بیماری زمینه ای داشته باشد، واکسن دیگری که برای کودکان بزرگتر مناسب است نیز داده می شود چون آن واکسن شامل گونه های بیشتری برای محافظت در برابر عفونت پنوموکوکی می باشد. واکسن ها حاوی اجزای غیر فعال از برخی گونه های باکتری پنوموکوک هستند تا یک پاسخ ایمنی را تحریک کنند.

چه کسی برای واکسن رایگان واجد شرایط هست؟

- تمام نوزادان در دو، چهار و 12 ماهگی

چک لیست قبل از ایمن سازی

قبل از اینکه فرزندتان را ایمن سازی بکنید اگر او یکی از موارد زیر را داشته باشد به دکتر یا پرستار بگوئید:

- در روز ایمن سازی مریض است
- واکنش شدیدی به یک واکسن داشته است
- به جزئی از یک واکسن حساسیت دارد

اطلاعات بیشتر

برای اطلاعات بیشتر، ایمن سازی دوران کودکی در <http://www.betterhealth.vic.gov.au> را جستجو کنید:

برای نسخه های ترجمه شده این سند به <http://www.healthtranslations.vic.gov.au> مراجعه کنید.

برای اطلاعات در مورد برنامه ایمن سازی ملی به <http://www.immunise.health.gov.au/> مراجعه کنید.

© حق کپی متعلق به وزارت بهداشت 2010. مجوز از طرف دولت ایلتی ویکتوریا
50 Lonsdale Street, Melbourne.
ژانویه 2011 . تلفن: 616 (1011012)



**Translating and
interpreting service
Call 131 450**