

# Poliomyelitis (Polio)

## Immunisation Information



# Полиомиелитис (полио)

## Информације о имунизацији

Serbian

### Полиомиелитис (полио)

У Аустралији је потребно да се људи имунизују против полија, иако већ више година овде није било случајева ове болести. У иностранству још увек има случајева ове болести, и постоји ризик да се она опет појави овде ако се деца и одрасли не имунизују.

Полио може да изазове благе симптоме или врло озбиљну болест. То је вирус који напада систем за варење и нервни систем. Он изазива високу температуру, повраћање и укоченост мишића и може да делује на нерве и на тај начин да изазове трајну парализу.

Ова болест може да паралише мишиће за дисање и гутање и на тај начин да изазове смрт. Између два и пет одсто особа са полиом умре од те болести, и око половине свих пацијената који преживе остаје трајно парализовано.

Полио може да се пренесе ако измет заражене особе загади храну, воду или руке.

### Неактивисана вакцина против полија (IPV)

IPV вакцина се даје инјекцијом. IPV вакцина садржи три врсте неактивисаних вируса полија. Четири дозе инјекције у размаку од два месеца између доза ће осигурати дуготрајан имунитет.

IPV може да се замени са оралном полио вакцином (OVP), ако су претходне дозе вакцине против полија узете преко уста.

### Одрасли

Одрасле особе треба да провере да ли су примиле најмање три дозе полио вакцине. Ако нису примиле три дозе, требало би да се обрате организацији која даје вакцине за имунизацију да добију додатну имунизацију. Додатна имунизација се препоручује одраслим особама само ако постоје ризици.

Особе које су изложене ризику су:

- Путници који посећују места или земље где има полија или где је полио распрострањен.
- Здравствени радници који могу да дођу у додир са особама које имају полиомиелитис.

Те особе би требало да приме додатну вакцинацију сваких десет година.

### Реакције на неактивисане вакцине против полија

#### Уобичајене нуспојаве неактивисане вакцине против полија:

- Болови у мишићима
- Благо повишене температура
- Бол, црвенило и оток на месту инјекције
- Мала краткотрајна гука на месту инјекције

### **Изузетно ретка нуспојава:**

- Јака алергијска реакција

Ако уследе благе реакције, оне могу да потрају од 1 до 2 дана. Нуспојаве могу да се ублаже:

- Узимањем додатне течности
- Ношењем лаке одеће
- Стављањем хладне влажне крпе на место инјекције које је болно
- Узимањем (или давањем детету) парацетамола да би се ублажила нелагодност (обратите пажњу на дозу која се препоручује према годинама детета)

Ако су реакције јаке или упорне, или ако сте забринути, контактирајте свог лекара или болницу.

### **Контролна листа пре имунизације**

Пре него што се ви или ваше дете имунизујете, кажите лекару или медицинској сестри ако се било шта са доњег списка односи на вас или на ваше дете:

- Не осећате се добро на дан имунизације (ако је температура изнад 38,5°C).
- Имали сте јаку реакцију на неку вакцину.
- Имали сте јаку алергију на неке састојке вакцине (нпр. на неомицин).