

Cấp cứu Người bị Quá liều do Opioid

Thực hiện theo các bước sau để tiêm naloxone

1

AN TOÀN


Kiểm tra người và khu vực xem có bất cứ điều gì không an toàn không.



2

QUÁ LIỀU OPIOID? TÌM KIẾM CÁC DẤU HIỆU


- Không phản ứng
- Đồng tử co lại
- Không thở bình thường - thở chậm nông hoặc ngáy
- Da nhợt nhạt hoặc lạnh, môi và đầu ngón tay xanh xao hoặc tái xám



3

GỌI BA SỐ KHÔNG (000)


Tôi nghĩ người đó bị quá liều



4


ĐẶT NGƯỜI ĐÓ NẪM NGHIÊNG

Đặt người đó ở tư thế hồi phục.



5


GẮN KIM VÀO ỐNG TIÊM



6

LẮC ỐNG THUỐC


Gõ nhẹ hoặc lắc ống thuốc để chất lỏng nằm ở đáy ống thuốc.



7

CẦM ỐNG THUỐC

Giữ phần đáy ống thuốc bằng một tay và tay kia kẹp phần đầu ống thuốc.




Tiếp tục ở trang tiếp theo

8

BẰNG GỖ ỚNG THUỐC


Bẻ gãy phần đầu của ống thuốc theo hướng ngược lại với bạn.
Sử dụng khăn giấy hoặc nắp bút để giảm nguy cơ bị thương.



9

BƠM NALOXONE VÀO ỚNG TIÊM


Ớng thuốc chứa đủ một liều naloxone.



10

TÌM VỊ TRÍ ĐỂ ĐÂM KIM


Đâm kim vào bắp đùi bên ngoài hoặc bắp tay trên.



11

TIÊM MỘT LIỀU NALOXONE


Tiêm toàn bộ liều thuốc naloxone.
Bạn có thể tiêm xuyên qua quần áo nếu cần.



12

HỌ CÒN THỞ KHÔNG?


Nếu không, hãy sử dụng phương pháp hô hấp nhân tạo nếu bạn biết cách – đặt người đó nằm ngửa và thổi hai (2) hơi vào miệng họ.



13

PHỤC HỒI


Đặt người ở tư thế hồi phục.
Ở cạnh người đó cho đến khi xe Cứu Thương đến.



14

LẶP LẠI LIỀU NẾU CẦN

Nếu không có dấu hiệu đáp ứng, hãy tiêm một liều khác cứ sau 2 đến 3 phút cho đến khi người đó hồi tỉnh hoặc xe cứu thương đến.



Sử dụng naloxone để giúp đảo ngược tình trạng quá liều opioid (ví dụ heroin, morphine, methadone, oxycodone, opioid được kê toa, fentanyl). Phải mất 2-5 phút thuốc mới bắt đầu có tác dụng và kéo dài khoảng 30-90 phút.

Để nhận tài liệu này ở định dạng khác, hãy email tới
<aod.enquiries@health.vic.gov.au>

Được Chính phủ Victoria cho phép và xuất bản, 1 Treasury Place, Melbourne.

Có sẵn tại <<https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program>>