

阿片类药物过量反应

请按照以下步骤使用纳洛酮 (Nyxoid) 鼻喷雾剂

1

安全

检查人员和区域是否存在任何不安全的情况。



2

是否为阿片类药物过量？ 寻找迹象

- 无反应
- 针尖样瞳孔
- 呼吸不正常——呼吸浅慢或打鼾
- 皮肤苍白或冰冷，嘴唇和指尖呈青色或灰色



3

拨打三个零 (000)


我认为这是服
药过量



4

让患者仰卧


让患者仰卧，检查患者的鼻腔
是否干净。



5

按照图示握住纳洛酮


请记住，纳洛酮[®]仅含有1剂。



6

将纳洛酮喷入鼻腔


将纳洛酮[®]的喷嘴插入鼻孔。
按下直至听到咔嗒声以给进行给药。



7

患者有呼吸吗？

如果患者没有呼吸，而您知道如何进行人工呼吸，请进行两次人工呼吸。



8

复苏


如果您知道如何操作，请将人员置于“复苏体位”。
留在患者身边，直到救护车到达。



9

必要时重复给药

如果患者没有反应，请在患者另一个鼻孔喷入第二剂纳洛酮[®]。
如果有药的话，每2到3分钟给药一次，直到患者复苏或救护车到达。



使用纳洛酮来逆转阿片类药物过量（例如海洛因、吗啡、美沙酮、羟考酮、处方阿片类药物、芬太尼）。
药物起效需要2-5分钟，药效能够持续约30-90分钟。

如需以其他格式接收本文件，请发送电子邮件至 <aod.enquiries@health.vic.gov.au>。

经新南威尔士州卫生部许可转载 © 2023。

由维多利亚州政府授权和出版，地址：1 Treasury Place, Melbourne。© 澳大利亚维多利亚州卫生部，

ISBN 978-1-76131-462-9 (pdf/ 在线 /MS word)。

可从[卫生部网站](https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program)获取 <https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program>。

2023年11月。(2303380)。