

# الاستجابة لتعاطي جرعة مفرطة من المواد الأفيونية

اتبع هذه الخطوات لحقن برينوكساد نالوكسون

2

## هل هي جرعة مفرطة من المواد الأفيونية؟ ابحث عن العلامات

- لا توجد استجابة
- حدقتا العينين ثابتتين
- التنفس غير طبيعي -  
التنفس بطيء ضحل أو بشخير
- البشرة شاحبة أو باردة والشفتان وأطراف الأصابع  
زرقاء أو رمادية



1

## الأمان


تحقق من الشخص والمنطقة بحثًا عن أي شيء غير آمن.



4

## ضع الشخص على جانبه

ضع الشخص في وضع التعافي.



3

## اتصل بالرقم ثلاثة أصفار (000)


أعتقد أنها جرعة مفرطة



7

## أعطي جرعة واحدة من نالوكسون

احقن 0.4 مل، حتى الخط الأسود الأول على الحقنة (تحتوي حقنة Prenoxad على 5 جرعات).



6


## وجه الإبرة

أدخل الإبرة في الجزء الخارجي من الفخذ أو الجزء العلوي من الذراع.



5


## ضع الإبرة على محقنة PRENOXAD المعبأة مسبقًا



10

## كرر إعطاء الجرعة إذا لزم الأمر

إذا لم تكن هناك استجابة، فقم بحقن جرعة 0.4 مل أخرى (إلى الخط الأسود التالي) كل 2 إلى 3 دقائق حتى يتعافى الشخص أو تصل سيارة الإسعاف.



9

## التعافي


ضع الشخص في وضع التعافي. ابقَ معه حتى وصول سيارة الإسعاف.



8

## هل يتنفس الشخص؟

إذا لم يكن الأمر كذلك، فاستخدم التنفس الإنقاذي إذا كنت تعرف كيفية القيام بذلك - ضع الشخص على ظهره وانفخ مرتين.



استخدم النالوكسون لعكس تأثير الجرعة المفرطة من المواد الأفيونية (مثل الهيروين والمورفين والميثادون، والأوكسيكودون، والمواد الأفيونية التي تستلزم وصفة طبية والفتانيل). يستغرق الأمر من 2 إلى 5 دقائق لبدء المفعول ويستمر حوالي 30-90 دقيقة.

تلقي هذا المستند بصيغة أخرى، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى [aod.enquiries@health.vic.gov.au](mailto:aod.enquiries@health.vic.gov.au).

مستنسخة بإذن، NSW Health © 2023.

صرحت به ونشرته حكومة ولاية فيكتوريا، 1 Treasury Place, Melbourne، © ولاية فيكتوريا، أستراليا، وزارة الصحة.

ISBN 978-1-76131-460-5 (pdf/online/MS word)

متاح على موقع الوزارة > <https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program>

تشرين الثاني / نوفمبر 2023. (2303380).