

ការឆ្លើយតបចំពោះការប្រើថ្នាំ អូភីអយ (Opioid) ហួសកម្រិត

អនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះសម្រាប់ការចាក់ថ្នាំ Prenoxad naloxone

1

សុវត្ថិភាព

ពិនិត្យមនុស្សនោះ និងផ្នែកជាក់លាក់សម្រាប់អ្វីដែលមិនមានសុវត្ថិភាព។



2

តើប្រើថ្នាំ OPIOID (អូភីអយ) ហួសកម្រិតឬ? រកមើលសញ្ញានានា

- មិនឆ្លើយតប
- ប្រស្រីភ្នែកជាប់តាំង
- ដកដង្ហើមមិនធម្មតា - ដកដង្ហើមរាក់ៗយឺតៗ ឬស្រមុក
- ស្បែកស្លេកស្លាំងឬត្រជាក់ បបូរមាត់និងចុងម្រាមដៃមានពណ៌ខៀវឬពណ៌ប្រផេះ



3

ហៅទូរសព្ទទៅលេខសូន្យបីដង (000)


ខ្ញុំគិតថាវាជាការប្រើប្រាស់ហួសកម្រិត



4


ឱ្យមនុស្សនោះដេកផ្ទាល់

ដាក់បុគ្គលក្នុងឥរិយាបថដេកឡើងវិញ។



5

**មូលមូលភ្ជាប់ទៅនឹងស៊ីរាំង
ដែលមានថ្នាំ PRENOXAD
បំពេញទុកមុន**



6

កំណត់ទីតាំងមូល


ចាក់មូលទៅក្នុងសាច់ដុំភ្លៅឬ
ដៃផ្នែកខាងលើ។



7

**ផ្តល់មួយដូសនៃថ្នាំ
NALOXONE**


ចាក់ 0.4mL រហូតដល់បន្ទាត់
ពណ៌ខ្មៅទី 1 នៅលើស៊ីរាំង
(ស៊ីរាំងថ្នាំ Prenoxad មាន
5 ដូស)។



8

តើពួកគេដកដង្ហើមទេ?

បើមិនដកដង្ហើមទេ សូមប្រើវិធី
សង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយផ្តិលខ្យល់ចូល
តាមផ្លូវដង្ហើម ប្រសិនបើអ្នកដឹងពី
របៀបធ្វើ - ដាក់បុគ្គលឱ្យដេកផ្លាស់
ហើយផ្តល់ 2 ដង្ហើម។



9

ការរើបឡើងវិញ


ដាក់បុគ្គលក្នុងឥរិយាបថរើប
ឡើងវិញ។
នៅជាមួយបុគ្គលនោះរហូត
ទាល់តែរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
មកដល់។



10

**ចាក់ដូសថ្នាំម្តងទៀត
ប្រសិនបើចាំបាច់**

ប្រសិនបើគ្មានការឆ្លើយតបទេ សូម
ចាក់ថ្នាំ 0.4mL មួយដូសទៀត
(រហូតដល់ជិតបន្ទាត់ពណ៌ខ្មៅ)
រៀងរាល់ 2 ទៅ 3 នាទី រហូតដល់
មនុស្សនោះរើបឡើងវិញ ឬរថយន្ត
សង្គ្រោះមកដល់។



ប្រើថ្នាំ naloxone ដើម្បីបន្តការប្រើប្រាស់ថ្នាំ Opioid (អ្នកអាយ) ហួសកម្រិត (ឧ. ថ្នាំហេរ៉ូអ៊ីន, មីរហ្វីន, មេតាដូន, អុកស៊ីកូដូន, ថ្នាំអ្នកអាយប្រើតាមវេជ្ជបញ្ជា, ហ្វេតានីល)។ វាត្រូវការពេល 2-5 នាទីមុននឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ ហើយមានប្រសិទ្ធភាពប្រមាណជា 30-90 នាទី។

ដើម្បីទទួលបានឯកសារនេះជាមេរៀនផ្សេងទៀត សូមអ៊ីមែល <aod.enquiries@health.vic.gov.au>។
បានផលិតឡើងវិញដោយមានការអនុញ្ញាត NSW Health © 2023។
ត្រូវបានអនុញ្ញាត និងបោះពុម្ពដោយរដ្ឋាភិបាលវិច្ឆិកា (Victorian), 1 Treasury Place, Melbourne។ © រដ្ឋវិច្ឆិកា ប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្រសួងសុខាភិបាល
ISBN 978-1-76131-460-5 (មេរៀន pdf/online/MS word)។
អាចរកបានពីគេហទំព័រសុខាភិបាលវិច្ឆិកា <https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program>។
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023។ (2303380)។