

LE 4 FASI DEL PRIMO SOCCORSO PER L'ASMA



1

Far sedere la persona in posizione retta

Somministrare **4** inalazioni separate di inalatore antiasmatico blu/grigio

- Agitare l'inalatore
- Mettere un'inalazione nel distanziatore
- Inspirare **4** volte dal distanziatore

Ripetere fino a quando sono state effettuate **4** inalazioni

Da ricordare: **agitare, 1 inalazione, inspirare 4 volte**

O somministrare due dosi separate dell'inalatore Bricanyl (dai 6 anni di età) o dell'inalatore Symbicort (dai 12 anni di età)



2

Aspettare **4** minuti

Se non vi sono miglioramenti, somministrare altre **4** inalazioni separate di inalatore antiasmatico blu/grigio come sopra

O somministrare 1 dose aggiuntiva di inalatore Bricanyl o Symbicort



3

Se non vi sono tuttavia miglioramenti, chiamare l'ambulanza al Triple Zero (000)

Continuare a somministrare **4** inalazioni separate ogni **4** minuti fino all'arrivo dei soccorsi

O 1 dose di Bricanyl o Symbicort ogni 4 minuti - fino a 3 dosi aggiuntive di Symbicort



4

Chiamare immediatamente il pronto soccorso. Chiamare Triple Zero (000):

- Se la persona non respira.
- Se l'asma improvvisamente peggiora o non migliora.
- Se la persona sta avendo un attacco di asma e non vi è un inalatore disponibile.
- Se non si è sicuri che sia asma.
- Se si sa che la persona ha shock anafilattici - seguire il suo piano d'azione in caso di shock anafilattico, e dare quindi il primo soccorso per l'asma. È improbabile che l'inalatore blu/grigio faccia male, anche se la persona non ha l'asma.

Proteggiti durante la stagione dei pollini.

È importante prendersi cura dell'asma e delle allergie.

Visita betterhealth.vic.gov.au o chiama

1800 ASTHMA (1800 278 462) per maggiori informazioni.

Autorizzato e pubblicato dal Governo del Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne (1708026)

© State of Victoria (Department of Health and Human Services).
Tranne il logo, coperto da licenza CC BY International 4.0.



**ASTHMA
AUSTRALIA**

