

類阿片藥物過量反應

請依照以下步驟使用 Nyxoid 鼻噴劑

1

安全

檢查人員和區域是否有任何不安全的情況。



2

類阿片藥物過量？ 尋找跡象

- 沒有反應
- 瞳孔放大
- 呼吸不正常—呼吸淺慢或打鼾
- 皮膚蒼白或冰冷，嘴唇和指尖呈藍色或灰色



3

撥打三個零 (000)


我認為有人服藥過量



4

將患者側躺


將背部作為支撐，
檢查鼻子是否乾淨。



5

依照以下手勢來握住 NYXOID


記住 Nyxoid® 僅含
1 劑。



6

將納洛酮注入鼻子


插入 Nyxoid® 噴嘴
在鼻孔。
按下直至聽到喀嚓聲
以完成藥物使用。



7

他們有呼吸嗎？

如果他們沒有呼吸，
且您知道如何進行人工
呼吸，請向他們進行
2 次人工呼吸。




8

復原

如您知道如何將患者置於
「復原臥式」，請將患者置於
該姿勢。


留在他們身邊直到救護車到達。



9

如有需要，請重複劑量

如果沒有反應，請給予第二劑
Nyxoid® 在另一個鼻孔裡。
如可能，請每 2 到 3 分鐘再使用
一次，直到患者康復或救護車到
達現場。



使用納洛酮逆轉類阿片藥物過量（例如海洛因、嗎啡、美沙酮、羥考酮、處方類阿片藥物、芬太尼）。
納洛酮需要 2-5 分鐘才會發揮效用，並持續約 30-90 分鐘。

若要以其他格式接收此文檔，請傳送電子郵件 <aod.enquiries@health.vic.gov.au>。

經新南威爾斯州衛生局許可轉載 © 2023。

由維多利亞州政府授權和出版，地址：1 Treasury Place, Melbourne。© 澳洲維多利亞省衛生部，

ISBN 978-1-76131-462-9 (pdf/online/MS word)。

可從該部門的網站 <<https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program>>。

2023 年 11 月。(2303380)。