

阿片类药物过量反应

请按照以下步骤操作 Prenoxad 纳洛酮注射液

1

安全

检查人员和区域是否存在任何不安全的情况。



2

是否为阿片类药物过量？ 寻找迹象

- 无反应
- 针尖样瞳孔
- 呼吸不正常——呼吸浅慢或打鼾
- 皮肤苍白或冰冷，嘴唇和指尖呈青色或灰色



3

拨打三个零 (000)


我认为这是服
药过量



4


让患者侧躺

将此人置于复苏体位。



5

将针头拧在预装 PRENOXAD 的针筒上面



6

将针头对准注射部位


将针头扎入大腿外侧
或上臂。



7

注射一剂纳洛酮


注射 0.4 毫升，直至注射器
上的第一条黑线 (Prenoxad
注射器包含 5 剂)。



8

患者有呼吸吗？


如果没有，而您知道如何
进行人工呼吸，请患者
放在仰卧位并进行
2 次人工呼吸。



9

复苏


将此人置于复苏体位。
留在患者身边，
直到救护车到达。



10

必要时重复给药

如果患者没有反应，
则每 2 至 3 分钟再注射
0.4 毫升剂量（到下一条
黑线），直到患者复苏或救
护车到达。



使用纳洛酮来逆转阿片类药物过量（例如海洛因、吗啡、美沙酮、羟考酮、处方阿片类药物、芬太尼）。
药物起效需要 2-5 分钟，药效能够持续约 30-90 分钟。

如需以其他格式接收本文件，请发送电子邮件至 <aod.enquiries@health.vic.gov.au>。

经新南威尔士州卫生部许可转载 © 2023。

由维多利亚州政府授权和出版，地址：1 Treasury Place, Melbourne。© 澳大利亚维多利亚州卫生部，

ISBN 978-1-76131-460-5 (pdf/ 在线 /MS word)。

可从[卫生部网站](https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program)获取 <https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program>。

2023 年 11 月。(2303380)。